

Datum: 19 maj 2016

Encepur och Encepur Barn (inaktiverat TBE virus vaccin) – försiktighetsåtgärd vid allvarlig överkänslighet mot ägg

Bästa hälso- och sjukvårdspersonal,

GLAXOSMITHKLINE vill, i samråd med Läkemedelsverket, informera om att försiktighetsåtgärder bör vidtagas vid immunisering med Encepur/Encepur Barn av individer med allvarlig överkänslighet mot ägg.

Sammanfattning

- Encepur och Encepur Barn (inaktiverat TBE virus vaccin) tillverkas med hjälp av kycklingembryoceller och kan därför innehålla rester av ägg- och kycklingprotein såsom ovalbumin.
- Patienter som är allergiska mot ägg och reagerat med kliniska symtom som urtikaria, svullna läppar och struplock, laryngospasm eller bronkospasm, blodtrycksfall eller chock efter att ha ätit ägg, bör immuniseras endast under noggrann klinisk övervakning och med beredskap för omedelbar akutbehandling vid behov.
- Produktinformationen för Encepur och Encepur Barn kommer att uppdateras med denna information.

Biverkningsrapportering

Hälso- och sjukvårdspersonal ska i enlighet med gällande nationella föreskrifter rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket (elektronisk blankett och instruktioner finns på www.lakemedelsverket.se).

Kontaktinformation för ytterligare information eller frågor

Vid medicinska frågor:

Claude Guiron, MD
claudio.guiron@gsk.com

scand.medinfo@gsk.com

Solna 19/5-2016



Claude Guiron
Medicinsk Direktör GSK Sverige