

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Aivlosin, 42,5 mg/g premix till medicinfoder för svin	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Aivlosin, 625 mg/g granulat för användning i dricksvatten för fjäderfä Ej godkänt för användning till äggläggande kalkoner som producerar ägg för humankonsumtion. Kalkon: ska inte ges inom 21 dagar före ägglägningens början.	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Aivlosin, 625 mg/g granulat för användning i dricksvatten för svin	Slakt	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Aivlosin, 8,5 mg/g oralt pulver	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Aivlosin, 8,5 mg/g premix till medicinfoder	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Alfaxan Multidose, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund, katt och husdjurskanin Använd ej till kaniner avsedda för humankonsumtion.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allfatal vet., 100 mg/ml avlivningsvätska för djur Får ej ges till djur som skall användas till livsmedelsproduktion.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alvegesic vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för hästar, hundar och katter	Mjölk	-	-	-	-	0h	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Aniketam vet, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-
	Slakt	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Animed vet, 24,5 mg/g kutan spray, suspension för nötkreatur, får och svin Används inte på juver hos lakterande djur som producerar mjök för humankonsumtion.	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Apiguard vet, 12,5 g gel för honungsbin Använd inte läkemedlet under honungsdrag	Honung	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Apistan vet, 10,3 % bikupestrip Använd inte produkten under honungsdrag. Ta inte honung från yngelkammaren. Skörda inte honung medan behandling pågår. För att undvika ackumulering av läkemedelsrester i vaxet ska yngelramarna regelbundet förses med nya vaxmellanväggar. Återanvänd inte vax från behandlade bisamhällen i yngel- eller honungsramar.	Honung	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Apivar vet, 500 mg bikupestrip för honungsbin Använd inte under honungsdrag. Skörda inte honung från yngelrummet. Skörda inte honung när behandlingen pågår. Yngelramar bör bytas ut mot nya mellanväggar minst var tredje år. Yngelramar skall inte återanvändas som honungsramar.	Honung	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Aqualec, 9 mg/ml infusionsvätska, lösning för nöt, häst, hund och katt	Mjök	0h	-	-	-	0h	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Attane vet., 1000 mg/g inhalationsånga, vätska Ska ej användas till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Avicillin vet., 1000 mg/g pulver för användning i dricksvatten för kycklingar, ankor, kalkoner Ej godkänt för användning till äggläggande fåglar som producerar ägg för humankonsumtion och som påbörjat sin äggläggning eller inom 3 veckor före ägglägningens början.	Slakt Chicken	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Slakt Duck	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
	Slakt Turkey	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
Avipro AE vet., vaccin mot AE hos unghönan, oral suspension Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Avipro Thymovac vet. frystorkat pulver för användning i dricksvatten	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Axilur vet., 10 % oral suspension	Mjölk	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	9	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Axilur vet., 19 % oral pasta	Slakt	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Axilur vet., 2,5 % oral suspension	Mjölk	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Axilur vet., 22 % granulat	Mjolk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	9	-	-	-	5	-	-	-	-
Axilur vet., 4 % oralt pulver	Slakt	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	Vid normal dos, 5 mg/kg.									
	Slakt	-	5	-	-	-	-	-	-	-
	Vid ökad dos, 25 mg/kg.									
Banminth vet., 44 % oral pasta	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Baycox Bovis vet., 50 mg/ml oral suspension Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	63	-	-	-	-	-	-	-	-
Baycox Ovine vet., 50 mg/ml oral suspension Ej tillåtet för användning till lakterande får som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	42	-	-	-	-	-	-
Baycox vet., 50 mg/ml oral suspension till svin	Slakt	-	77	-	-	-	-	-	-	-
Baycoxine vet, 50 mg/ml oral suspension till nöt, svin och får Nöt: Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion. Får: Ej tillåtet för användning till lakterande får som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	63	77	42	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Belfer vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning till hästar, kor, grisar, får, getter och hundar	Mjök	0	-	0	0	0	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Benestermycin vet. intramammär salva	Mjök	37	-	-	-	-	-	-	-	-
		Vid behandling mindre än 35 dagar före kalvning, eller under laktation: 37 dagar efter behandling. Vid behandling 35 dagar eller mer före kalvning: 36 timmar efter kalvning.								
Beviplex vet., injektionsvätska, lösning	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	0	-	-	-	-
Bimectin vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	49	28	-	-	-	-	28	-	-
	Slakt	-	-	-	-	14	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Bimotrim vet., 200 mg/ml + 40 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjolk	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Vid en dygnsdos på 15 mg/kg kroppsvikt i.m., s.c., eller i.v. i högst 5 dygn										
	Mjolk	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Vid en dygnsdos på 2 gånger 15 mg/kg kroppsvikt i.m., s.c. eller i.v. i högst 5 dygn										
	Slakt	24	21	-	-	-	-	-	-	-	
	Vid en dygnsdos på 15 mg/kg kroppsvikt i.m. eller s.c. i högst 5 dygn										
Slakt	10	-	-	-	10	-	-	-	-		
Vid en dygnsdos på 15 mg/kg kroppsvikt i.v. i högst 5 dygn											
Slakt	48	42	-	-	-	-	-	-	-		
Vid en dygnsdos på 2 gånger 15 mg/kg kroppsvikt i.m. eller s.c. i högst 5 dygn											
Slakt	20	-	-	-	20	-	-	-	-		
Vid en dygnsdos på 2 gånger 15 mg/kg kroppsvikt i.v. i högst 5 dygn											
Bimoxyl vet., 150 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjolk	4	-	-	-	-	-	-	-		
	Slakt	30	11	-	-	-	-	-	-		
Blaze vet., 7,5 mg/ml pour-on, suspension för nötkreatur och får	Mjolk	0	-	12h	-	-	-	-	-		
	Slakt	18	-	1	-	-	-	-	-		
BLUEVAC BTV8 injektionsvätska, suspension för nötkreatur och får	Mjolk	0	-	0	-	-	-	-	-		
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-		

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Cepesedan vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst och nöt	Mjolk	12h	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Chanox vet, 50 mg/ml oral suspension för svin, nötkreatur och får Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion. Ej godkänt för användning till lakterande får som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	63	77	42	-	-	-	-	-	-	-
Cirbloc injektionsvätska, emulsion för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Circovac emulsion och suspension till injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Closamectin vet, 5 mg/ml + 200 mg/ml pour-on, lösning till nöt Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion, inklusive under sinperioden. Använd inte till kvigor under andra hälften av dräktighetsperioden om djuren är avsedda för mjölkproduktion för humant bruk. På grund av uppenbar risk för kontaminering med medlet mellan behandlade och obehandlade djur genom slickning, skall alla djur i en grupp behandlas samtidigt och behandlade djur hållas separerade från obehandlade djur under hela karenstiden. Om denna rekommendation inte följs kan det medföra att gränsvärden för läkemedlet överskrids hos obehandlade djur.	Slakt	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLYNAV injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Coglapix injektionsvätska, suspension för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Colicol vet., 240 mg/ml lösning för användning i dricksvatten	Slakt	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Coliprotec F4 frystorkat pulver för suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Coliprotec F4/F18 frystorkat pulver för suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Comforion vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	4	4	-	-	4	-	-	-	-	-
Compagel vet. gel för häst Använd inte till dräktiga eller lakterande djur som ska producera mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Contacera, 15 mg/ml oral suspension för hästar	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Contacera, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, svin och häst	Mjolk	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Dectomax, 5 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur Skall ej ges till lakterande kor som producerar mjölk för humankonsumtion eller till sinkor eller dräktiga mjölkkvigor inom 60 dagar före kalvning.	Slakt	35	-	-	-	-	-	-	-	-	
Deltaspot vet, 10 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur och får På grund av den signifikanta sannolikheten för att andra, icke behandlade djur, ska korskontamineras genom slickning, ska behandlade djur hållas avskilda från icke behandlade djur under hela karenstiden. Om denna rekommendation inte följs kan det leda till restmängder hos icke behandlade djur.	Mjölk	0h	-	24h	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	18	-	35	-	-	-	-	-	-	
Denagard vet., 125 mg/ml lösning för användning i dricksvatten	Slakt	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
Denagard vet., 20 mg/g premix till medicinfoder	Slakt	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Slakt	-	6	-	-	-	-	-	-	-	
		Förebyggande (vid 2,0 mg/kg kroppsvikt): 1 dag Behandling (vid 5 -10 mg/kg kroppsvikt): 6 dagar									
	Slakt	-	-	-	-	-	4	-	-	-	
		Hönor Slakt: 1 dag									
		Kalkoner Slakt: 4 dagar									
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
		Karens ägg 0 dagar avser hönor									
Denagard vet., 200 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	22	-	-	-	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Detonervin, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst och nöt	Mjölk	12h	-	-	-	12h	-	-	-	-	-
	Slakt	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Dexadreson vet., 2 mg/ml injektionsvätska, lösning Ej godkänt för användning till lakterande häst som producerar mjölk för humankonsumtion	Mjölk	72h	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	8	2	-	-	8	-	-	-	-	-
Dexaject, 2 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, häst, gris, hund och katt Ej tillåtet för användning till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.	Mjölk	72h	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	8	2	-	-	8	-	-	-	-	-
Dihydrostreptomycin vet., 500 mg tablett Läkemedlet får användas till häst i enlighet med 4§ Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:3) om karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel, H 65, vilket innebär att en karenstid på minst 28 dygn skall tillämpas.	Mjölk	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-
Dilaterol vet., 25 mikrogram/ml sirap för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-
Dinalgen vet., 150 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt, svin och häst Ej tillåtet att använda till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Mjölk	0h	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Dinolytic vet., 12,5 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinolytic vet., 5 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Distocur vet., 34 mg/ml oral suspension för nötkreatur	Mjölk	108 <i>h</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		108 timmar motsvarar 4,5 dygn.									
Slakt	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dolorex vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning till häst, hund och katt	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Domodin vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	12 <i>h</i>	-	-	-	12 <i>h</i>	-	-	-	-	-
	Slakt	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Domosedan vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Domosedan vet., 7,6 mg/ml munhålel											
	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
Doxycycline Divasa-Farmavic, 200 mg/ml lösning för användning i dricksvatten											
Ej tillåtet för användning till äggläggande fåglar som producerar ägg för human konsumtion. Skall inte användas inom 4 veckor före äggläggningsperiodens början.	Slakt	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
		efter en dos på 10 mg/kg kroppsvikt i 4 dagar									
	Slakt	-	-	-	-	-	12	-	-	-	
		efter en dos på 20 mg/kg kroppsvikt i 4 dagar									
Draxxin, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning											
Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion. Skall inte ges till dräktiga djur som skall producera mjölk för humankonsumtion inom två månader före förväntad nedkomst.	Slakt	22	13	16	-	-	-	-	-	-	
DRAXXIN, 25 mg/ml injektionsvätska, lösning											
	Slakt	-	13	-	-	-	-	-	-	-	
Droncit vet., 9 % oral gel											
Skall inte användas till ston vars mjölk används för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
Econor, 10 % oralt pulver för svin											
	Slakt	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Econor, 10 % premix till medicinfoder för svin											
	Slakt	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Eprizero vet, 5 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur	Mjök	0h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Equibactin vet., 333 mg/g + 67 mg/g oral pasta för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjök för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	14	-	-	-	-
	Mjök	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equilis Prequenza Te, injektionsvätska, suspension för hästar	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Mjök	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equilis Prequenza, injektionsvätska, suspension för hästar	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Mjök	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equilis StrepE, frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för häst	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Mjök	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equilis Te, injektionsvätska, suspension för hästar	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Mjök	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equilis West Nile injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Mjök	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Equilis West Nile injektionsvätska, suspension, förfylld spruta										
	Mjolk	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equimax vet oral gel för häst Ej tillåtet att använda till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	35	-	-	-	-
Equimaxtabs vet, 150 mg/20 mg tugtablett för häst Ej tillåtet att använda till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	35	-	-	-	-
EQUIOXX, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-	-
EQUIOXX, 57 mg tugtablett	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-	-
EQUIOXX, 8,2 mg/g oral pasta för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-	-
Equip F vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equip FT vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equip T vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equip WNV injektionsvätska, emulsion för hästar	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Euthasol vet., 400 mg/ml injektionsvätska, lösning Tillräckliga åtgärder ska vidtas för att se till att kadaver av djur som behandlats med detta läkemedel, och restprodukterna från dessa djur, inte kommer in i näringskedjan och inte används för människors eller djurs konsumtion.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Evalon suspension och vätska till oral spray	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Exagon vet., 400 mg/ml injektionsvätska, lösning Tillräckliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att kadaver av djur som behandlats med detta läkemedel, och restprodukterna från dessa djur, inte kommer in i näringskedjan och inte används för människors eller djurs konsumtion.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excenel vet., pulver till injektionsvätska, lösning	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Exoflox vet., 25 mg/ml koncentrat till oral lösning Ej godkänt för användning till djur som producerar livsmedel för humankonsumtion.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exzolt, 10 mg/ml lösning för användning i dricksvatten till fjäderfä	Slakt	-	-	-	-	-	14	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Fenoflox vet, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötk och svin	Mjolk	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Intravenös injektion									
	Mjolk	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subkutan injektion									
	Slakt	-	13	-	-	-	-	-	-	-
Intramuskulär injektion										
Slakt	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
Intravenös injektion										
Slakt	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subkutan injektion										
Fenylbutazon vet., 1 g oralt pulver i dospåse Läkemedlet får endast användas till hästar som förklarats inte vara avsedda för livsmedelsproduktion, i enlighet med 2 kap 7 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:84) om läkemedel och läkemedelsanvändning, D9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ferglep vet, 200 mg/ml injektionsvätska, lösning för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	
Filavac RHD injektionsvätska, suspension för kaniner	Slakt	-	-	-	-	-	-	-	0	
Filavac RHD suspension och vätska till injektionsvätska, suspension för kaniner	Slakt	-	-	-	-	-	-	-	0	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Finadyne vet, 50 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur På grund av risk för kontaminering med detta läkemedel till icke-behandlade djur, t ex genom slickande, bör behandlade djur hållas åtskilda från icke-behandlade djur under hela karenstiden. Om denna rekommendation inte följs kan det leda till resthalter hos icke-behandlade djur.	Mjök	36h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Finadyne vet., 50 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjök	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	18	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt im	7	-	-	-	7	-	-	-	-
	Slakt iv	4	-	-	-	1	-	-	-	-
Flimabend vet, 100 mg/g suspension för användning i dricksvatten för svin och kyckling	Slakt	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	Slakt 1 mg/kg kroppsvikt i 5 dagar.	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt 2,5 mg/kg kroppsvikt i 2 dagar.	-	4	-	-	-	-	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Florselect vet, 300 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt och svin Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjök för humankonsumtion.	Slakt	30	18	-	-	-	-	-	-	-
Flunipaste Vet., 50 mg/g oral gel Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjök för humankonsumtion	Slakt	-	-	-	-	15	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Gleptosil vet., 200 mg Fe³⁺/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Gripovac 3 injektionsvätska, suspension för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
HALAGON, 0,5 mg/ml oral lösning för kalvar	Slakt	13	-	-	-	-	-	-	-	-
Halocur, 0,5 mg/ml oral lösning för kalvar	Slakt	13	-	-	-	-	-	-	-	-
		Karenstid avser spädkalv								
Hipotrim vet., 200 mg/ml + 40 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	10	-	-	-	-	-	-	-	-
		vid administrering 2 gånger per dygn.								
	Mjök	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		vid administrering en gång per dygn								
	Slakt	48	42	-	-	-	-	-	-	-
		vid administrering 2 gånger per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn								
	Slakt	20	-	-	-	20	-	-	-	-
		vid administrering 2 gånger per dygn, i.v. injektion								
	Slakt	24	21	-	-	-	-	-	-	-
		vid administrering en gång per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn								
	Slakt	10	-	-	-	10	-	-	-	-
		vid administrering en gång per dygn, i.v. injektion								

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Hippotrim vet., 288,3 mg/g + 58,0 mg/g oral pasta	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
Hippoazol vet, 400 mg enterogranulat för häst Ej godkänt för användning till digivande lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för nötkreatur	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipracal-FM infusionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipracin vet., 17 mikrogram (10 IU)/ml injektionsvätska, lösning för svin, nöt, häst och hund	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-
Hipracox spray suspension och lösning till spray	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
HuveGuard MMAT vet suspension till oral suspension för kycklingar	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Imrestor, 15 mg injektionsvätska, lösning, förfylld spruta	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Inflacam, 15 mg/ml oral suspension för hästar Ej tillåtet för användning till digivande djur som producerar mjölk för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Inflacam, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt, svin och hästar Får ej användas för hästar som producerar mjölk för human konsumtion.	Mjök	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-
Inflacam, 330 mg granulat	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Inflacam, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund och katt. för nötkreatur och svin.	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-
Infusolec infusionsvätska, lösning för nöt, häst, hund och katt	Mjök	0h	-	-	-	0h	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	0	-	-	-	-
Ingelvac CircoFLEX injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Ingelvac MycoFLEX injektionsvätska, suspension för grisar	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Ivomec vet., 0,6 % premix till medicinfoder	Slakt	-	12	-	-	-	-	-	-	-
Ivomec vet., 0,8 mg/ml oral lösning Tackor och getter som producerar mjölk för human konsumtion får inte behandlas under laktation eller inom 28 dygn före laktation.	Slakt	-	-	6	8	-	-	-	-	-
Ivomec vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning när mjölken är avsedd för human konsumtion.	Slakt	49	28	-	-	-	28	-	-	-
Ivomec vet., 18,7 mg/g oral pasta Får inte användas till ston som producerar mjölk till humant bruk.	Slakt	-	-	-	-	14	-	-	-	-
Ketador vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0h	-	-	-	0h	-	-	-	-
	Slakt	0	0	-	-	0	-	-	-	-
Ketaminol vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Ketaminol vet., 50 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Ketastesic Vet, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund, katt och häst	Mjölk	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Ketodolor vet, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst, nötkreatur och svin Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för human konsumtion.	Mjölk	0h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	4	-	-	1	-	-	-	-
	Slakt	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	efter intramuskulär administrering									
	Slakt	1	-	-	-	-	-	-	-	-
efter intravenös administrering										
Kexxtone, 32,4 g intraruminalinlägg, kontinuerlig frisättning	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Lacosamide STADA, 200 mg filmdragerad tablett	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Lactovac vet. injektionsvätska, suspension	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Lidor vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Lincophar vet, 400 mg/ml lösning för användning i dricksvatten för kycklingar Inte avsett för användning till äggläggande fåglar som producerar ägg för mänsklig konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	5	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Locatim, oral lösning	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Gäller nyfödda kalvar som är yngre än 12 timmar.										
Loxicom, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst, nöt och svin	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-
Loxicom, 50 mg/g oral pasta	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Maxyl vet, 500 mg/g pulver för användning i dricksvatten för kycklingar, kalkoner, ankor och grisar	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Ej godkänt för användning till fåglar som producerar ägg för humankonsumtion och som påbörjat sin äggläggning eller inom 3 veckor före äggläggningens början.	Slakt	-	-	-	-	-	9	-	-	-
	Ankor									
	Slakt	-	-	-	-	-	5	-	-	-
	Kalkoner									
	Slakt	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Kycklingar									
Melovem, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt, svin, och häst	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Melovem, 30 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt och svin	Mjolk	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Melovem, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och svin	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mjolk	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meloxidolor, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-	-
	Mjolk	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meloxidolor, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mjolk	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MELOXIDYL, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst, nöt och svin	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-	-
	Mjolk	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mepiblock Vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	Mjolk	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Mepidor vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning till häst	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	Mjolk	-	-	-	-	72h	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Naxcel, 200 mg/ml injektionsvätska, suspension för nötkreatur	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Det är viktigt att NAXCEL endast ges subkutant vid öronbasen i icke-ätlig vävnad för att uppfylla karenstiden för kött.										
Nematel vet., 439 mg/g oral pasta för häst Ej tillåtet för användning till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Nerfasin vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning till nötkreatur och häst	Mjolk	0h	-	-	-	0h	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Nerfasin vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning till nötkreatur, häst, hund och katt	Mjolk	0h	-	-	-	0h	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Nimatek Vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund, katt och häst	Mjolk	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Nobilis Gumboro Inac. vet., injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Nobilis IB Ma5 vet., frystorkat pulver för suspension	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Nobilis IB Multi vet., injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Nobilis IB Primo QX frystorkat pulver för suspension	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Nobilis IB Primo QX frystorkat pulver och vätska till suspension	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Nobilis IBmulti-ND-EDS injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Nobilis Influenza H5N2 injektionsvätska, emulsion för kyckling Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Nobilis ND C2 vet. frystorkat pulver till suspension för okulonasal eller sprayadministrering	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Nobilis OR inac, injektionsvätska, emulsion Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Nobilis Rismavac + CA126 vet., koncentrat och vätska till injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
NobilisIB 4-91, frystorkat pulver för suspension	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Nobivac Myxo-RHD frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Nobivac Rabies vet., 2 IE injektionsvätska, suspension	Mjölk	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-
Noromectin Comp vet., 18,7 mg + 140,3 mg oral pasta för häst Ej godkänt för användning till ston som producerar mjölk för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-
Noromectin Pour-on vet., 5 mg/ml pour-on, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Noromectin vet, 0,8 mg/ml oral lösning Skall ej användas till djur som producerar mjölk för human konsumtion. Djuren får inte behandlas inom 60 dagar före begynnande laktation om mjölken är avsedd för human konsumtion.	Slakt	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
Noromectin vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	49	28	-	-	-	-	28	-	-	-
Noromectin vet., 18,7 mg/g oral pasta Ivermektin skall ej ges till hästar vars mjölk är avsedd för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Panacur AquaSol, 200 mg/ml suspension för användning i dricksvatten										
	Slakt	-	4	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	-	6	-	-	-
	vid dosering med 1 mg fenbendazol/kg									
	Slakt	-	-	-	-	-	9	-	-	-
	vid dosering med 2 mg fenbendazol/kg									
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Paracox-5 vet., koncentrat till oral suspension Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Paracox-8 vet., suspension för användning i dricksvatten Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Partoxin vet., 10 IU/ml injektionsvätska, lösning	Mjolk	0	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	0	0	-	-	0	-	-	-	-
Parvoduk suspension och vätska till injektionsvätska, suspension Do not use in birds in lay.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Parvoruvax vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Plegicil vet, 35 mg/ml oral gel för häst Läkemedlet är inte godkänt för användning till hästar avsedda för livsmedelsproduktion. Emellertid finns den aktiva substansen på listan över viktiga substanser för behandling av hästdjur, i enlighet med Kommissionens förordning (EG) 1950/2006. Därmed kan läkemedlet användas till häst förutsatt att en karenstid på minst sex månader tillämpas.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plegicil vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Läkemedlet är inte godkänt för användning till hästar avsedda för livsmedelsproduktion. Emellertid finns den aktiva substansen på listan över viktiga substanser för behandling av hästdjur, i enlighet med Kommissionens förordning (EG) 1950/2006. Därmed kan läkemedlet användas till häst förutsatt att en karenstid på minst sex månader tillämpas.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Polyvar, 275 mg bikupestrip Behandla inte under honungsdrag	Honung	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Porcilis APP vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis AR-T DF, injektionsvätska, suspension för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis ColiClos injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis Ery-Parvo vet., injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis PCV ID injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Prosolvin vet., 7,5 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Proteq West Nile injektionsvätska, suspension för häst	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
ProteqFlu injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
ProteqFlu-Te injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Pulmodox vet., 5 % premix till medicinfoder	Slakt	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Quadrisol, 100 mg/ml oral gel till häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjök för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
Rabisin vet., 1 IE/dos injektionsvätska, suspension	Mjök	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
Receptal vet., 4,2 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Recocam, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, svin och häst Ej tillåtet för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-	-
Relmont vet, 1,38 g vaginalinlägg för nötkreatur Mjölken kan användas till humankonsumtion under behandlingen.	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repose vet, 500 mg/ml injektionsvätska, lösning Tillräckliga åtgärder skall vidtas för att se till att kadaver av djur som behandlats med detta läkemedel, och restprodukterna från dessa djur, inte kommer in i näringskedjan och inte används för människors eller djurs konsumtion.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESPIPORC FLU3 injektionsvätska, suspension för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
RESPIPORC FLUpan H1N1 injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Rhemox vet, 500 mg/g pulver för användning i dricksvatten Ej godkänt för användning till äggläggande fåglar som producerar ägg för humankonsumtion och inom 4 veckor innan ägglägningsperioden börjar.	Slakt	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt Ankor	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
	Slakt Kalkoner	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
	Slakt Kycklingar	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Suvaxyn PRRS MLV (25 doser) frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Suvaxyn PRRS MLV (50 doser) frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Synvet, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	-	-	-	-	0h	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Systemex vet., 3,75 g intraruminalinlägg, periodvis frisättning Lakterande mjölkkor eller kvigor som förväntas kalva inom 180 dygn får ej behandlas.	Slakt	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Taf vet., 28,5 mg/g kutan spray, lösning	Mjölk	0h	-	0h	0h	0h	-	-	-	-
	Använd inte på juver till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.									
	Slakt	0	14	0	0	0	-	-	-	0
Taurador vet., 5 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur Använd inte till lakterande kor som producerar mjölk för humankonsumtion, eller sinkor eller dräktiga kvigor inom 60 dagar före kalvning.	Slakt	35	-	-	-	-	-	-	-	-
Terramycin vet., 500 mg intrauterin tablett	Mjölk	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	10	10	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Tylan vet., 10 % premix till medicinfoder	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Tylan vet., 2 % premix till medicinfoder	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Tylan vet., 200 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	35	21	-	-	-	-	-	-	-
Tylan vet., 83 % pulver till oral lösning Tylan vet. skall ej ges till värphöns vars ägg är avsedda för human konsumtion.	Slakt	-	1	-	-	-	2	-	-	-
Tylocure, 910 mg/g granulat för användning i dricksvatten	Slakt	-	24h	-	-	-	-	-	-	-
Tylucyl, 200 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och svin	Mjök	108h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	28	14	-	-	-	-	-	-	-
Ubroseal vet, 2,6 g intramammär suspension för nötkreatur	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ultrasan vet. injektionsvätska, lösning	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	28	28	28	-	28	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Uniferon, 200 mg fe3+/ml injektionsvätska, lösning											
	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Valbazen vet., 19 mg/ml oral suspension Får inte användas till får som producerar mjök för humankonsumtion.											
	Slakt	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-
VarroMed, 5 mg/ml + 44 mg/ml bikupedispersion											
	Honung	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
VarroMed, 75 mg + 660 mg bikupedispersion											
	Honung	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Vaxxitek HVT+IBD, suspension och vätska till injektionsvätska, suspension Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion											
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Vectormune ND för kyckling suspension och vätska till injektionsvätska, suspension											
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Wellicox, 50 mg/ml injektionsvätska, lösning till nötkreatur, svin och häst Skall inte användas till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Mjölk (i.m.)	36h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mjölk (i.v.)	24h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	20	-	-	10	-	-	-	-
	Slakt (i.m.)	31	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt (i.v.)	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventipulmin vet., 16 mikrogram/g granulat Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	28	-	-	-	-
Ventipulmin vet., 25 mikrogram/ml oral lösning Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	28	-	-	-	-
VEPURED injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Versiguard Rabies vet. injektionsvätska, suspension	Mjölk	0	-	0	0	0	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	0	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Vetalgin vet., 500 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intravenös eller intramuskulär behandling som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt										
	Slakt	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-
	Intravenös behandling 2-3 ggr med 8 timmars intervall med en dos av högst 20-50 mg/kg kroppsvikt:										
	Slakt	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
Intravenös behandling som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt											
Slakt	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Intravenös eller intramuskulär behandling som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt											
Slakt	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	
Intravenös eller intramuskulär som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt											
Vetflurane, 1000 mg/g inhalationsånga, vätska för hästar, hundar, katter, burfåglar, reptiler, råttor, möss, hamstrar, chinchillor, ökenråttor, marsvin och illrar Produkten ska inte användas för behandling av ston som producerar mjölk för human konsumtion	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
Vetrimoxin vet., 150 mg/ml injektionsvätska, suspension för nötkreatur och svin	Mjök	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	18	20	-	-	-	-	-	-	-	
Vetroxy vet, 200 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, får och svin	Mjök	10	-	7	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	31	18	9	-	-	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Vetzin vet, 1000 mg/g premix till medicinfoder för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Vigophos vet, 100 mg/ml + 0,05 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur	Mjölk	0h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Vorenvet vet., 1 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjölk	60h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	42	42	-	-	42	-	-	-	-
Vulketan vet, 2,5 mg/g gel för hästar	Mjölk	-	-	-	-	0h	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Xylavet, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Xylocain adrenalin, 10 mg/ml + 5 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning	Slakt <= 400 mg	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt > 400 mg	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Xylocain viskös, 20 mg/ml oral lösning	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Zeleris, 400 mg/ml + 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur	Slakt	56	-	-	-	-	-	-	-	-
	Not authorised for use in animals producing milk for human consumption.									
Zepromec vet, 5 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur	Mjölk	0h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Zerofen vet., 4 % oralt pulver för svin	Slakt	-	3	-	-	-	-	-	-	-
ZOLVIX, 25 mg/ml oral lösning för får Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	7	-	-	-	-	-	-
Zorabel vet, 50 mg/ml oral suspension för svin	Slakt	-	73	-	-	-	-	-	-	-
ZULVAC 1 Bovis injektionsvätska, suspension för nötkreatur	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
ZULVAC 1 Ovis injektionsvätska, suspension för får	Mjölk	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	0	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
ZUPREVO, 40 mg/ml injektionsvätska, lösning för svin										
	Slakt	-	9	-	-	-	-	-	-	-