



Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
<b>Aivlosin, 42,5 mg/g premix till medicinfoder för svin</b>	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-
<b>Aivlosin, 625 mg/g granulat för användning i dricksvatten för fjäderfä</b> Ej godkänt för användning till äggläggande kalkoner som producerar ägg för humankonsumtion. Kalkon: ska inte ges inom 21 dagar före äggläggningens början.	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Aivlosin, 625 mg/g granulat för användning i dricksvatten för svin</b>	Slakt	-	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Aivlosin, 8,5 mg/g oralt pulver</b>	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-
<b>Aivlosin, 8,5 mg/g premix till medicinfoder</b>	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-
<b>Alfaxan Multidose, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund, katt och husdjurskanin</b> Använd ej till kaniner avsedda för humankonsumtion.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Allfatal vet., 100 mg/ml avlivningsvätska för djur</b> Får ej ges till djur som skall användas till livsmedelsproduktion.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Altresyn, 4 mg/ml oral lösning för svin</b>	Slakt	-	9	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>Alvegesic vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för hästar, hundar och katter</b>	Mjölk	-	-	-	-	0h	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
<b>Aniketam vet, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	Mjölk	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-
	Slakt	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
<b>Apiguard vet, 12,5 g gel för honungsbin</b> Använd inte läkemedlet under honungsdrag	Honung	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
<b>Apistan vet, 10,3 % bikupestrip</b> Använd inte produkten under honungsdrag. Ta inte honung från yngelkammaren. Skörda inte honung medan behandling pågår. För att undvika ackumulering av läkemedelsrester i vaxet ska yngelramarna regelbundet förses med nya vaxmellanväggar. Återanvänd inte vax från behandlade bisamhällen i yngel- eller honungsramar.	Honung	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
<b>Apivar vet, 500 mg bikupestrip för honungsbin</b> Använd inte under honungsdrag. Skörda inte honung från yngelrummet. Skörda inte honung när behandlingen pågår. Yngelramar bör bytas ut mot nya mellanväggar minst var tredje år. Yngelramar skall inte återanvändas som honungsramar.	Honung	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
<b>Aqualec, 9 mg/ml infusionsvätska, lösning för nöt, häst, hund och katt</b>	Mjölk	0h	-	-	-	0h	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>Attane vet., 1000 mg/g inhalationsånga, vätska</b> Ska ej användas till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
<b>Avicillin vet., 1000 mg/g pulver för användning i dricksvatten för kycklingar, ankor, kalkoner</b> Ej godkänt för användning till äggläggande fåglar som producerar ägg för humankonsumtion och som påbörjat sin äggläggning eller inom 3 veckor före ägglägningens början.	Slakt Chicken	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Slakt Duck	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
	Slakt Turkey	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
<b>Avipro AE vet., vaccin mot AE hos unghönan, oral suspension</b> Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Avipro Thymovac vet. frystorkat pulver för användning i dricksvatten</b>	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Axilur vet., 10 % oral suspension</b>	Mjölk	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	9	-	-	-	5	-	-	-	-	-
<b>Axilur vet., 19 % oral pasta</b>	Slakt	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
<b>Axilur vet., 2,5 % oral suspension</b>	Mjölk	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
<b>Axilur vet., 22 % granulat</b>	<b>Mjolk</b>	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	9	-	-	-	5	-	-	-	-
<b>Axilur vet., 4 % oralt pulver</b>	<b>Slakt</b>	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	Vid normal dos, 5 mg/kg.									
	<b>Slakt</b>	-	5	-	-	-	-	-	-	-
	Vid ökad dos, 25 mg/kg.									
<b>Banminth vet., 44 % oral pasta</b>	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Baycoxine vet, 50 mg/ml oral suspension till nöt, svin och får</b>	<b>Slakt</b>	63	77	42	-	-	-	-	-	-
Nöt: Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.										
Får: Ej tillåtet för användning till lakterande får som producerar mjölk för humankonsumtion.										
<b>Baymite vet, 500 mg/ml koncentrat till spray, emulsion till värphöns</b>	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	-	25	-	-	-
	Efter andra behandlingen.									
	<b>Ägg</b>	-	-	-	-	-	12h	-	-	-
	Ta bort ägg innan behandling. Kassera ägg som lagts under behandlingen och resten av dagen.									
<b>Bayticol vet., 10 mg/ml pour-on, lösning</b>	<b>Mjolk</b>	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	10	-	10	-	-	-	-	-	-
Bayticol vet. får ej användas till får som producerar mjölk för human konsumtion.										









Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Bovilis Blue-8 injektionsvätska, suspension	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Bovilis Bovipast vet., injektionsvätska, suspension för nötkreatur	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Bovilis BTV8 injektionsvätska, suspension för nötkreatur och får	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Bovilis Ringvac vet., pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Boviseal vet, 2,6 g intramammär suspension mjölkkor vid sinläggning	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
BTVPUR AlSap 1-8 injektionsvätska, suspension för får och nötkreatur	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-





Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
<b>Closamectin vet, 5 mg/ml + 200 mg/ml pour-on, lösning till nöt</b>										
Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion, inklusive under sinperioden. Använd inte till kvigor under andra hälften av dräktighetsperioden om djuren är avsedda för mjölkproduktion för humant bruk. På grund av uppenbar risk för kontaminering med medlet mellan behandlade och obehandlade djur genom slickning, skall alla djur i en grupp behandlas samtidigt och behandlade djur hållas separerade från obehandlade djur under hela karenstiden. Om denna rekommendation inte följs kan det medföra att gränsvärden för läkemedlet överskrids hos obehandlade djur.	<b>Slakt</b>	<b>28</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CLYNAV injektionsvätska, lösning</b>										
	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>	-	-
<b>Coglapix injektionsvätska, suspension för svin</b>										
	<b>Slakt</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Colicol vet., 240 mg/ml lösning för användning i dricksvatten</b>										
	<b>Slakt</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Coliprotec F4 frystorkat pulver för suspension</b>										
	<b>Slakt</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Coliprotec F4/F18 frystorkat pulver för suspension</b>										
	<b>Slakt</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Comforion vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>										
	<b>Mjölk</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	-	-	<b>4</b>	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>Compagel vet. gel för häst</b> Använd inte till dräktiga eller lakterande djur som ska producera mjölk för humankonsumtion.	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-
<b>Contacera, 15 mg/ml oral suspension för hästar</b>	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	<b>3</b>	-	-	-	-	-
<b>Contacera, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, svin och häst</b>	<b>Mjolk</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	-	-	<b>5</b>	-	-	-	-	-
<b>Coxevac injektionsvätska, suspension för nötkreatur och get</b>	<b>Mjolk</b>	<b>0</b>	-	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	<b>0</b>	-	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Cronyxin vet, 50 mg/g oral pasta för häst</b> Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	<b>15</b>	-	-	-	-	-
<b>Cyclopray vet, 78,6 mg/g kutan spray, suspension för svin, får och nötkreatur</b> Använd inte på juver hos lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	<b>Mjolk</b>	<b>0h</b>	-	<b>0h</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Cydectin comp vet., 19,5 mg/g + 121,7 mg/g oral gel</b> Skall ej ges till lakterande ston vars mjölk används för human konsumtion.	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	<b>64</b>	-	-	-	-	-
<b>Cydectin vet, 18,92 mg/g oral gel för häst</b>	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	<b>32</b>	-	-	-	-	-



Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Denagard vet., 20 mg/g premix till medicinfoder	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>	
	<b>Slakt</b>	-	<b>6</b>	-	-	-	-	-	-	-	
	Förebyggande (vid 2,0 mg/kg kroppsvikt): 1 dag Behandling (vid 5 -10 mg/kg kroppsvikt): 6 dagar										
	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	-	<b>4</b>	-	-	-	-
	Hönor Slakt: 1 dag  Kalkoner Slakt: 4 dagar										
	<b>Ägg</b>	-	-	-	-	-	<b>0</b>	-	-	-	
Karens ägg 0 dagar avser hönor											
Denagard vet., 200 mg/ml injektionsvätska, lösning	<b>Slakt</b>	-	<b>22</b>	-	-	-	-	-	-	-	
Detonervin, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst och nöt	<b>Mjölk</b>	<b>12h</b>	-	-	-	<b>12h</b>	-	-	-	-	
	<b>Slakt</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>	-	-	-	-	
Dexadreson vet., 2 mg/ml injektionsvätska, lösning Ej godkänt för användning till lakterande häst som producerar mjölk för humankonsumtion	<b>Mjölk</b>	<b>72h</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Slakt</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	-	-	<b>8</b>	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>Dexaject, 2 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, häst, gris, hund och katt</b> Ej tillåtet för användning till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.	Mjölk	72h	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	8	2	-	-	8	-	-	-	-	-
<b>Dihydrostreptomycin vet., 500 mg tablett</b> Läkemedlet får användas till häst i enlighet med 4§ Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:3) om karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel, H 65, vilket innebär att en karenstid på minst 28 dygn skall tillämpas.	Mjölk	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dilaterol vet., 25 mikrogram/ml sirap för häst</b> Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-
<b>Dinalgen vet., 150 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt, svin och häst</b> Ej tillåtet att använda till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Mjölk	0h	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>Dinolytic vet., 12,5 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur</b>	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dinolytic vet., 5 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-





Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>Doxycycline Divasa-Farmavic, 200 mg/ml lösning för användning i dricksvatten</b>											
Ej tillåtet för användning till äggläggande fåglar som producerar ägg för human konsumtion. Skall inte användas inom 4 veckor före äggläggningsperiodens början.	<b>Slakt</b>	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
		efter en dos på 10 mg/kg kroppsvikt i 4 dagar									
	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	-	12	-	-	-	
		efter en dos på 20 mg/kg kroppsvikt i 4 dagar									
<b>Draxxin, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>											
Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion. Skall inte ges till dräktiga djur som skall producera mjölk för humankonsumtion inom två månader före förväntad nedkomst.	<b>Slakt</b>	22	13	16	-	-	-	-	-	-	
<b>DRAXXIN, 25 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>											
	<b>Slakt</b>	-	13	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Econor, 10 % oralt pulver för svin</b>											
	<b>Slakt</b>	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Econor, 10 % premix till medicinfoder för svin</b>											
	<b>Slakt</b>	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Econor, 50 % premix till medicinfoder för svin</b>											
	<b>Slakt</b>	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ECOPORC SHIGA injektionsvätska, suspension</b>											
	<b>Slakt</b>	-	0	-	-	-	-	-	-	-	



Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>Equibactin vet., 333 mg/g + 67 mg/g oral pasta för häst</b> Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-
<b>Equilis Prequenza Te, injektionsvätska, suspension för hästar</b>	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
<b>Equilis Prequenza, injektionsvätska, suspension för hästar</b>	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
<b>Equilis StrepE, frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för häst</b>	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
<b>Equilis Te, injektionsvätska, suspension för hästar</b>	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
<b>Equilis West Nile injektionsvätska, suspension</b>	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
<b>Equilis West Nile injektionsvätska, suspension, förfylld spruta</b>	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>Equimax vet oral gel för häst</b> Ej tillåtet att använda till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-
<b>Equimaxtabs vet, 150 mg/20 mg tuggtablett för häst</b> Ej tillåtet att använda till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-
<b>EQUIOXX, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst</b> Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-
<b>EQUIOXX, 57 mg tuggtablett</b>	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-
<b>EQUIOXX, 8,2 mg/g oral pasta för häst</b> Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-
<b>Equip F vet., injektionsvätska, suspension</b>	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
<b>Equip FT vet., injektionsvätska, suspension</b>	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
<b>Equip T vet., injektionsvätska, suspension</b>	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
<b>Equip WNV injektionsvätska, emulsion för hästar</b>	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
<b>Equipulmin vet, 25 mikrogram/ml sirap till häst</b> Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>Equisedan vet, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst</b>											
	Mjölk	-	-	-	-	12h	-	-	-	-	
	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
<b>Equisolon, 100 mg oralt pulver för häst</b>											
	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-	-	
<b>Equisolon, 300 mg oralt pulver för häst</b>											
	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-	-	
<b>Equisolon, 33,3 mg/g oralt pulver för häst</b>											
	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-	-	
<b>Equisolon, 600 mg oralt pulver för häst</b>											
	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-	-	
		Ej godkänt för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.									
<b>Eraquell vet., 18,7 mg/g oral pasta</b>											
Får ej användas till ston, som producerar mjölk till humant bruk.											
	Slakt	-	-	-	-	30	-	-	-	-	
<b>Eraquell vet., 20 mg tuggtablett för häst</b>											
Ej tillåtet för användning till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.											
	Slakt	-	-	-	-	35	-	-	-	-	
<b>ERAVAC injektionsvätska, emulsion</b>											
	Slakt	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
<b>ERYSENG injektionsvätska, suspension</b>											
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ERYSENG PARVO injektionsvätska, suspension</b>											
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	



Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>Evalon suspension och vätska till oral spray</b>	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Exagon vet, 400 mg/ml injektionsvätska, lösning</b> Tillräckliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att kadaver av djur som behandlats med detta läkemedel, och restprodukterna från dessa djur, inte kommer in i näringskedjan och inte används för människors eller djurs konsumtion.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Excenel vet., pulver till injektionsvätska, lösning</b>	<b>Mjölk</b>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Exoflox vet., 25 mg/ml koncentrat till oral lösning</b> Ej godkänt för användning till djur som producerar livsmedel för humankonsumtion.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Exzolt, 10 mg/ml lösning för användning i dricksvatten till fjäderfä</b>	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
	<b>Ägg</b>	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-





Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>Finadyne vet, 50 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur</b> På grund av risk för kontaminering med detta läkemedel till icke-behandlade djur, t ex genom slickande, bör behandlade djur hållas åtskilda från icke-behandlade djur under hela karenstiden. Om denna rekommendation inte följs kan det leda till resthalter hos icke-behandlade djur.	<b>Mjolk</b>	<b>36h</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Slakt</b>	<b>7</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Flimabend vet, 100 mg/g suspension för användning i dricksvatten för svin och kyckling</b>	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	-	-	-	-	
	<b>Slakt</b>	-	<b>3</b>	-	-	-	-	-	-	-	
		1 mg/kg kroppsvikt i 5 dagar.									
	<b>Slakt</b>	-	<b>4</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,5 mg/kg kroppsvikt i 2 dagar.										
	<b>Ägg</b>	-	-	-	-	<b>0</b>	-	-	-	-	
<b>Florselect vet, 300 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt och svin</b> Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	<b>Slakt</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	<b>15</b>	-	-	-	-	
<b>Flunipaste Vet., 50 mg/g oral gel</b> Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	<b>15</b>	-	-	-	-	
	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	<b>15</b>	-	-	-	-	
<b>Flunixin N-vet, 250 mg granulat till häst</b> Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för human konsumtion.	<b>Mjolk</b>	<b>36h</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Slakt</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	-	-	<b>7</b>	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
<b>Flyecto vet, 12,5 mg/ml pour-on, lösning för får</b>										
	<b>Mjolk</b>	-	-	120h	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	-	-	8	-	-	-	-	-	-
<b>Folliplan vet., 4 mg/ml oral lösning för svin</b>										
	<b>Slakt</b>	-	9	-	-	-	-	-	-	-
<b>Fyrantel vet, 400 mg/g oral pasta</b>										
	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>GastroGard, 370 mg/g oral pasta</b> Använd inte till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.										
	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	1	-	-	-	-
<b>Geepenil vet., 24 g pulver och vätska till injektionsvätska, lösning</b>										
	<b>Mjolk</b>	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	10	10	-	-	10	-	-	-	-
<b>Gentaject vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning</b> Häst: Ej godkänt för användning till hästar som producerar kött eller mjölk för humankonsumtion.										
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gleptosil vet., 200 mg Fe3+/ml injektionsvätska, lösning</b>										
	<b>Slakt</b>	-	0	-	-	-	-	-	-	-
<b>HALAGON, 0,5 mg/ml oral lösning för kalvar</b>										
	<b>Slakt</b>	13	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Halocur, 0,5 mg/ml oral lösning för kalvar</b>										
	<b>Slakt</b>	13	-	-	-	-	-	-	-	-
		Karenstid avser spädkalv								

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>Hippotrim vet., 200 mg/ml + 40 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	<b>Mjolk</b>	<b>10</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	vid administrering 2 gånger per dygn.										
	<b>Mjolk</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	vid administrering en gång per dygn										
	<b>Slakt</b>	<b>48</b>	<b>42</b>	-	-	-	-	-	-	-	
	vid administrering 2 gånger per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn										
<b>Slakt</b>	<b>20</b>	-	-	-	<b>20</b>	-	-	-	-		
vid administrering 2 gånger per dygn, i.v. injektion											
<b>Slakt</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	-	-	-	-	-	-	-		
vid administrering en gång per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn											
<b>Slakt</b>	<b>10</b>	-	-	-	<b>10</b>	-	-	-	-		
vid administrering en gång per dygn, i.v. injektion											
<b>Hippotrim vet., 288,3 mg/g + 58,0 mg/g oral pasta</b>	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	<b>10</b>	-	-	-		
Ej godkänt för användning till digivande lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.											
<b>Hippoazol vet., 400 mg enterogranulat för häst</b>	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	-	-	-		
<b>HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för nötkreatur</b>	<b>Mjolk</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>Slakt</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-		

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Hipracal-FM infusionsvätska, lösning	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipracin vet., 17 mikrogram (10 IU)/ml injektionsvätska, lösning för svin, nöt, häst och hund	Mjök	0	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	0	0	-	-	0	-	-	-	-
Hipracox spray suspension och lösning till spray	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
HuveGuard MMAT vet suspension till oral suspension för kycklingar	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-
HuveGuard NB vet suspension till oral suspension för kycklingar	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-
HY-50 Vet., 17 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
<b>Hyobac App 2 Vet. injektionsvätska, emulsion</b>	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Hyobac App Multi Vet. injektionsvätska, emulsion</b>	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Hyonate vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Hyoresp, injektionsvätska, suspension</b>	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ibmune frystorkat pulver till okulonasal suspension till kyckling</b>	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
<b>Improvac injektionsvätska, lösning för svin</b>	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Imrestor, 15 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta</b>	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Inflacam, 15 mg/ml oral suspension för hästar</b> Ej tillåtet för användning till digivande djur som producerar mjölk för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-
<b>Inflacam, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt, svin och hästar</b> Får ej användas för hästar som producerar mjölk för human konsumtion.	Mjolk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Inflacam, 330 mg granulat	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Inflacam, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund och katt. för nötkreatur och svin.	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Infusolec infusionsvätska, lösning för nöt, häst, hund och katt	Mjök	0h	-	-	-	0h	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Ingelvac CircoFLEX injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingelvac MycoFLEX injektionsvätska, suspension för grisar	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingelvac PCV FLEX injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Innovax-ILT suspension och vätska till injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Innovax-ND-IBD suspension och vätska till injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
<b>Intraseal, 2,6 g intramammär suspension för kor</b>										
	<b>Mjolk</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Isocare Vet, 1000 mg/g inhalationsånga, vätska</b> Mjolk: Inte godkänt för användning till ston som producerar mjolk för humankonsumtion.	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	-	-	-	-
<b>IsoFlo vet., 100 % inhalationsånga, vätska</b>	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	-	-	-	-
<b>Ivomec Comp oral pasta häst</b> Skall inte användas till ston som producerar mjolk för human konsumtion.	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	<b>30</b>	-	-	-	-
<b>Ivomec pour on vet., 5 mg/ml pour-on, lösning</b> Lakterande mjolkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	<b>Slakt</b>	<b>15</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ivomec vet., 0,6 % premix till medicinfoder</b>	<b>Slakt</b>	-	<b>12</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ivomec vet., 0,8 mg/ml oral lösning</b> Tackor och getter som producerar mjolk för human konsumtion får inte behandlas under laktation eller inom 28 dygn före laktation.	<b>Slakt</b>	-	-	<b>6</b>	<b>8</b>	-	-	-	-	-
<b>Ivomec vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning</b> Lakterande mjolkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning när mjolken är avsedd för human konsumtion.	<b>Slakt</b>	<b>49</b>	<b>28</b>	-	-	-	-	<b>28</b>	-	-
<b>Ivomec vet., 18,7 mg/g oral pasta</b> Får inte användas till ston som producerar mjolk till humant bruk.	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	<b>14</b>	-	-	-	-





Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>Lacosamide STADA, 200 mg filmdragerad tablett</b>	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Lactovac vet. injektionsvätska, suspension</b>	<b>Mjök</b>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Lidobel vet., 16 mg/ml injektionsvätska, lösning till häst, hund och katt</b>	<b>Mjök</b>	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
<b>Lidor vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	<b>Mjök</b>	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
<b>Lincophar vet, 400 mg/ml lösning för användning i dricksvatten för kycklingar</b> Inte avsett för användning till äggläggande fåglar som producerar ägg för mänsklig konsumtion.	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
<b>Locatim, oral lösning</b>	<b>Slakt</b>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gäller nyfödda kalvar som är yngre än 12 timmar.									
<b>Loxicom, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst, nöt och svin</b>	<b>Mjök</b>	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	15	5	-	-	5	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>Loxicom, 50 mg/g oral pasta</b>	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
<b>Maxyl vet, 500 mg/g pulver för användning i dricksvatten för kycklingar, kalkoner, ankor och grisar</b> Ej godkänt för användning till fåglar som producerar ägg för humankonsumtion och som påbörjat sin äggläggning eller inom 3 veckor före äggläggningens början.	<b>Slakt</b>	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Slakt</b> Ankor	-	-	-	-	-	9	-	-	-	
	<b>Slakt</b> Kalkoner	-	-	-	-	-	5	-	-	-	
	<b>Slakt</b> Kycklingar	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
<b>Melovem, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt, svin, och häst</b>	<b>Mjolk</b>	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Slakt</b>	15	5	-	-	5	-	-	-	-	
<b>Melovem, 30 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt och svin</b>	<b>Mjolk</b>	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Slakt</b>	15	5	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Melovem, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och svin</b>	<b>Slakt</b>	15	5	-	-	-	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>Meloxidolor, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-	-
<b>Meloxidolor, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MELOXIDYL, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst, nöt och svin</b>	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-	-
<b>Mepiblock Vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst</b>	Mjölk	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
<b>Mepidor vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning till häst</b>	Mjölk	-	-	-	-	72h	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
<b>Metacam för häst, 15 mg/ml oral suspension</b>	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
<b>Metacam för nötkreatur och häst, 40 mg/ml injektionsvätska, lösning</b> Not authorised to use in horses producing milk for human consumption.	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	-	-	-	5	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Metacam för nötkreatur och svin, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-
	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Metacam för nötkreatur, svin och häst, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-
	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Metacam för svin, 15 mg/ml oral suspension	Slakt	-	5	-	-	-	-	-	-	-
	Mjölk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MS-H Vaccine ögondroppar, suspension	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Mypravac Suis injektionsvätska, suspension	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Mjölk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Naxcel, 100 mg/ml injektionsvätska, suspension för svin	Slakt	-	71	-	-	-	-	-	-	-
	Mjölk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Naxcel, 200 mg/ml injektionsvätska, suspension för nötkreatur	Slakt	9	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-

Det är viktigt att NAXCEL endast ges subkutant vid öronbasen i icke-ätlig vävnad för att uppfylla karenstiden för kött.

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>Nematel vet., 439 mg/g oral pasta för häst</b> Ej tillåtet för användning till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
<b>Neocolipor vet., injektionsvätska, suspension</b>	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nerfasin vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning till nöt och häst</b>	Mjölk	0h	-	-	-	0h	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>Nerfasin vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning till nöt, häst, hund och katt</b>	Mjölk	0h	-	-	-	0h	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>Nimatek Vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund, katt och häst</b>	Mjölk	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>Nobilis Gumboro Inac. vet., injektionsvätska, emulsion</b>	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Nobilis IB Ma5 vet., frystorkat pulver för suspension</b>	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>Nobilis IB Multi vet., injektionsvätska, emulsion</b>	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Nobilis IB Primo QX frystorkat pulver för suspension</b>	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Nobilis IB Primo QX frystorkat pulver och vätska till suspension</b>	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Nobilis IBmulti-ND-EDS injektionsvätska, emulsion</b>	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Nobilis Influenza H5N2 injektionsvätska, emulsion för kyckling</b> Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Nobilis ND C2 vet. frystorkat pulver till suspension för okulonasal eller sprayadministrering</b>	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Nobilis OR inac, injektionsvätska, emulsion</b> Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Nobilis Rismavac + CA126 vet., koncentrat och vätska till injektionsvätska, suspension</b>	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>NobilisIB 4-91, frystorkat pulver för suspension</b>	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-







Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>Panacur AquaSol, 200 mg/ml suspension för användning i dricksvatten</b>											
	Slakt	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	-	-	-	-	-	6	-	-	-	
		vid dosering med 1 mg fenbendazol/kg									
	Slakt	-	-	-	-	-	9	-	-	-	
		vid dosering med 2 mg fenbendazol/kg									
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
<b>Paracox-5 vet., suspension för oral administrering för kycklingar</b>											
	Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.										
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
<b>Paracox-8 vet., suspension för oral administrering för kycklingar</b>											
	Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion										
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
<b>Partoxin vet., 10 IU/ml injektionsvätska, lösning</b>											
	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-	
	Slakt	0	0	-	-	0	-	-	-	-	
<b>Parvодук suspension och vätska till injektionsvätska, suspension</b>											
	Do not use in birds in lay.										
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
<b>Parvoruvax vet., injektionsvätska, suspension</b>											
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	



Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
<b>Plegicil vet, 35 mg/ml oral gel för häst</b> Läkemedlet är inte godkänt för användning till hästar avsedda för livsmedelsproduktion. Emellertid finns den aktiva substansen på listan över viktiga substanser för behandling av hästdjur, i enlighet med Kommissionens förordning (EG) 1950/2006. Därmed kan läkemedlet användas till häst förutsatt att en karenstid på minst sex månader tillämpas.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Plegicil vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning</b> Läkemedlet är inte godkänt för användning till hästar avsedda för livsmedelsproduktion. Emellertid finns den aktiva substansen på listan över viktiga substanser för behandling av hästdjur, i enlighet med Kommissionens förordning (EG) 1950/2006. Därmed kan läkemedlet användas till häst förutsatt att en karenstid på minst sex månader tillämpas.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Polyvar, 275 mg bikupestrip</b> Behandla inte under honungsdrag	<b>Honung</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>	-
<b>Porcilis APP vet., injektionsvätska, suspension</b>	<b>Slakt</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Porcilis AR-T DF, injektionsvätska, suspension för svin</b>	<b>Slakt</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Porcilis ColiClos injektionsvätska, suspension</b>	<b>Slakt</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Porcilis Ery-Parvo vet., injektionsvätska, emulsion</b>	<b>Slakt</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Porcilis PCV ID injektionsvätska, emulsion</b>	<b>Slakt</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-



Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>Prosolvin vet., 7,5 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>Proteq West Nile injektionsvätska, suspension för häst</b>	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
<b>ProteqFlu injektionsvätska, suspension</b>	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
<b>ProteqFlu-Te injektionsvätska, suspension</b>	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
<b>Pulmodox vet., 5 % premix till medicinfoder</b>	Slakt	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Quadrisol, 100 mg/ml oral gel till häst</b> Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
<b>Rabisin vet., 1 IE/dos injektionsvätska, suspension</b>	Mjölk	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
<b>Receptal vet., 4,2 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning</b>	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>Recocam, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, svin och häst</b> Ej tillåtet för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	<b>Mjölk</b>	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	15	5	-	-	5	-	-	-	-	-
<b>Relmont vet, 1,38 g vaginalinlägg för nötkreatur</b> Mjölken kan användas till humankonsumtion under behandlingen.	<b>Mjölk</b>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Repose vet, 500 mg/ml injektionsvätska, lösning</b> Tillräckliga åtgärder skall vidtas för att se till att kadaver av djur som behandlats med detta läkemedel, och restprodukterna från dessa djur, inte kommer in i näringskedjan och inte används för människors eller djurs konsumtion.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESPIPORC FLU3 injektionsvätska, suspension för svin</b>	<b>Slakt</b>	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESPIPORC FLUpan H1N1 injektionsvätska, suspension</b>	<b>Slakt</b>	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Rhemox vet, 500 mg/g pulver för användning i dricksvatten</b> Ej godkänt för användning till äggläggande fåglar som producerar ägg för humankonsumtion och inom 4 veckor innan ägglägningsperioden börjar.	<b>Slakt</b>	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b> Ankor	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
	<b>Slakt</b> Kalkoner	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
	<b>Slakt</b> Kycklingar	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-







Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
<b>Santiola vet., 50 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt och får</b> Ej godkänt för användning till lakterande kor som producerar mjölk för humankonsumtion, inklusive under sinperiod. Använd inte till dräktiga kvigor som ska producera mjölk för humankonsumtion under den sista trimestern före förväntad nedkomst.  Ej godkänt för användning till lakterande tackor som producerar mjölk för humankonsumtion, inklusive under sinperiod. Använd inte inom 1 år före första lamning hos tackor som ska producera mjölk för humankonsumtion.	<b>Slakt</b>	77	-	77	-	-	-	-	-	-
<b>Sebacil vet., 500 mg/ml koncentrat till kutan lösning</b> Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	<b>Slakt</b>	-	9	42	-	-	-	-	-	-
<b>Sedivet vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning</b> Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för human konsumtion.	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	10	-	-	-	-
<b>Selevitan vet., 30 mg/g+0,6 mg/g granulat</b>	<b>Mjölk</b>	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	0	0	0	-	0	-	-	-	-
<b>Selevitan vet., 50 mg/ml+0,6 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	<b>Mjölk</b>	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	2	2	2	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
<b>Siccalactin vet. intramammär salva</b>	<b>Mjök</b>	<b>30</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Leverans av mjök får ske tidigast 4 dygn efter kalvning om behandling skett 4 veckor eller längre tid före kalvning. Leverans av mjök får ske tidigast 30 dygn efter behandling om denna skett 4-1 veckor före kalvning, dock tidigast 4 dygn efter kalvning. Leverans av mjök får ske tidigast 30 dygn efter kalvning om behandling skett 1 vecka eller kortare tid före kalvning.									
	<b>Slakt</b>	<b>35</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Solvidine vet, 200 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst</b>	<b>Mjök</b>	-	-	-	-	<b>0</b>	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	<b>0</b>	-	-	-	-
<b>Somulose, 400 mg/ml + 25 mg/ml avlivningsvätska för djur</b> Får ej användas till djur avsedda för livsmedels eller foderproduktion. Behandlade djur får aldrig konsumeras av människa eller djur.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Spasmium vet., 500 mg/ml + 4 mg/ml injektionsvätska, lösning</b> Använd inte till ston som producerar mjök för humankonsumtion.	<b>Mjök</b> (i.v)	<b>4</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b> (i.m)	-	<b>15</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b> (i.v)	<b>12</b>	-	-	-	<b>12</b>	-	-	-	-
<b>Spotinor vet, 10 mg/ml spot-on, lösning för nötkreatur och får</b> Ej tillåtet för användning till fårhonor som producerar mjök för humankonsumtion.	<b>Mjök</b>	<b>0h</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	<b>17</b>	-	<b>35</b>	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
<b>STARTVAC injektionsvätska, emulsion för nötkreatur</b>										
	<b>Mjök</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Stellamune One vet., injektionsvätska, emulsion</b>										
	<b>Slakt</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Streptocillin vet., 200 mg/200 mg intramammär salva</b>										
	<b>Mjök</b>	<b>6</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	<b>10</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Streptocillin vet., 250 mg/ml + 200 mg/ml injektionsvätska, suspension</b>										
Läkemedlet får användas till häst i enlighet med 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:3) om karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel, H 65, vilket innebär att en karenstid på 60 dygn skall tillämpas.										
	<b>Mjök</b>	<b>12</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Suiseng vet. injektionsvätska, suspension för svin</b>										
	<b>Slakt</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Suivac APP Vet. injektionsvätska, emulsion för svin</b>										
	<b>Slakt</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Suvaxyn Aujesky 783+O/W, injektionsvätska, emulsion</b>										
	<b>Slakt</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Suvaxyn Circo injektionsvätska, emulsion</b>										
	<b>Slakt</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Suvaxyn Circo+MH RTU injektionsvätska, suspension</b>										
	<b>Slakt</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-



Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>Taf vet., 28,5 mg/g kutan spray, lösning</b>	<b>Mjök</b>	<b>0h</b>	-	<b>0h</b>	<b>0h</b>	<b>0h</b>	-	-	-	-	-
	Använd inte på juver till lakterande djur som producerar mjök för humankonsumtion.										
	<b>Slakt</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	<b>0</b>
<b>Taurador vet., 5 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur</b> Använd inte till lakterande kor som producerar mjök för humankonsumtion, eller sinkor eller dräktiga kvigor inom 60 dagar före kalvning.	<b>Slakt</b>	<b>35</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Terramycin vet., 500 mg intrauterin tablett</b>	<b>Mjök</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tetroxy prolongatum vet., 200 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	<b>Mjök</b>	<b>7</b>	-	<b>7</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>ThoroVAX vet., injektionsvätska, emulsion</b>	<b>Slakt</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Toltarox vet., 50 mg/ml oral suspension för svin</b>	<b>Slakt</b>	-	<b>77</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Torbudine Vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för hundar, katter och hästar</b> Ej godkänt för användning till ston som producerar mjök för humankonsumtion.	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-









Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>Vaxxitek HVT+IBD, suspension och vätska till injektionsvätska, suspension</b> Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Vectormune ND för kyckling suspension och vätska till injektionsvätska, suspension</b>	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Ventipulmin vet., 16 mikrogram/g granulat</b> Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-
<b>Ventipulmin vet., 25 mikrogram/ml oral lösning</b> Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-
<b>VEPURED injektionsvätska, suspension</b>	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Versiguard Rabies vet. injektionsvätska, suspension</b>	Mjölk	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
<b>Vetalgin vet., 500 mg/ml injektionsvätska, lösning</b>	<b>Mjolk</b>	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intravenös eller intramuskulär behandling som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt										
	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-
	Intravenös behandling 2-3 ggr med 8 timmars intervall med en dos av högst 20-50 mg/kg kroppsvikt:										
	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
Intravenös behandling som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt											
<b>Slakt</b>	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Intravenös eller intramuskulär behandling som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt											
<b>Slakt</b>	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	
Intravenös eller intramuskulär som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt											
<b>Vetflurane, 1000 mg/g inhalationsånga, vätska för hästar, hundar, katter, burfåglar, reptiler, råttor, möss, hamstrar, chinchillor, ökenråttor, marsvin och illrar</b> Produkten ska inte användas för behandling av ston som producerar mjölk för human konsumtion	<b>Slakt</b>	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
	Intravenös eller intramuskulär som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt										
<b>Vetrimoxin vet., 150 mg/ml injektionsvätska, suspension för nötkreatur och svin</b>	<b>Mjolk</b>	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Slakt</b>	18	20	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Vetroxy vet, 200 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, får och svin</b>	<b>Mjolk</b>	10	-	7	-	-	-	-	-	-	
	<b>Slakt</b>	31	18	9	-	-	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Vetzin vet, 1000 mg/g premix till medicinfoder för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Vigophos vet, 100 mg/ml + 0,05 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur	Mjölk	0h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Vorenvet vet., 1 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjölk	60h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	42	42	-	-	42	-	-	-	-
Vulketan vet, 2,5 mg/g gel för hästar	Mjölk	-	-	-	-	0h	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Xylavet, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Xylocain adrenalin, 10 mg/ml + 5 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning	Slakt <= 400 mg	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt > 400 mg	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Xylocain viskös, 20 mg/ml oral lösning	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-



Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
<b>Zeleris, 400 mg/ml + 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur</b>	<b>Slakt</b>	<b>56</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Not authorised for use in animals producing milk for human consumption.									
<b>Zepromec vet, 5 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur</b>	<b>Mjölk</b>	<b>0h</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	<b>15</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zerofen vet., 4 % oralt pulver för svin</b>	<b>Slakt</b>	-	<b>3</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>ZOLVIX, 25 mg/ml oral lösning för får</b> Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	<b>Slakt</b>	-	-	<b>7</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Zorabel vet, 50 mg/ml oral suspension för svin</b>	<b>Slakt</b>	-	<b>73</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>ZULVAC 1 Bovis injektionsvätska, suspension för nötkreatur</b>	<b>Mjölk</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ZULVAC 1 Ovis injektionsvätska, suspension för får</b>	<b>Mjölk</b>	-	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Slakt</b>	-	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-



Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
ZUPREVO, 40 mg/ml injektionsvätska, lösning för svin										
	Slakt	-	9	-	-	-	-	-	-	-