

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Aivlosin, 42,5 mg/g premix till medicinfoder för svin	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Aivlosin, 625 mg/g granulat för användning i dricksvatten för fjäderfä Ej godkänt för användning till äggläggande kalkoner som producerar ägg för humankonsumtion. Kalkon: ska inte ges inom 21 dagar före ägglägningens början.	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Aivlosin, 625 mg/g granulat för användning i dricksvatten för svin	Slakt	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Aivlosin, 8,5 mg/g oralt pulver	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Aivlosin, 8,5 mg/g premix till medicinfoder	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Alfaxan Multidose, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund, katt och husdjurskanin Använd ej till kaniner avsedda för humankonsumtion.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allfatal vet., 100 mg/ml avlivningsvätska för djur Får ej ges till djur som skall användas till livsmedelsproduktion.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altresyn, 4 mg/ml oral lösning för svin	Slakt	-	9	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Alvegesic vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för hästar, hundar och katter	Mjök	-	-	-	-	0h	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Aniketam vet, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-
	Slakt	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Apiguard vet, 12,5 g gel för honungsbin Använd inte läkemedlet under honungsdrag	Honung	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Apistan vet, 10,3 % bikupestrip Använd inte produkten under honungsdrag. Ta inte honung från yngelkammaren. Skörda inte honung medan behandling pågår. För att undvika ackumulering av läkemedelsrester i vaxet ska yngelramarna regelbundet förses med nya vaxmellanväggar. Återanvänd inte vax från behandlade bisamhällen i yngel- eller honungsramar.	Honung	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Apivar vet, 500 mg bikupestrip för honungsbin Använd inte under honungsdrag. Skörda inte honung från yngelrummet. Skörda inte honung när behandlingen pågår. Yngelramar bör bytas ut mot nya mellanväggar minst var tredje år. Yngelramar skall inte återanvändas som honungsramar.	Honung	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Aqualec, 9 mg/ml infusionsvätska, lösning för nöt, häst, hund och katt	Mjök	0h	-	-	-	0h	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Attane vet., 1000 mg/g inhalationsånga, vätska Ska ej användas till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Avicillin vet., 1000 mg/g pulver för användning i dricksvatten för kycklingar, ankor, kalkoner Ej godkänt för användning till äggläggande fåglar som producerar ägg för humankonsumtion och som påbörjat sin äggläggning eller inom 3 veckor före ägglägningens början.	Slakt Chicken	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Slakt Duck	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
	Slakt Turkey	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
Avipro AE vet., vaccin mot AE hos unghönan, oral suspension Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Avipro Thymovac vet. frystorkat pulver för användning i dricksvatten	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Axilur vet., 10 % oral suspension	Mjölk	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	9	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Axilur vet., 19 % oral pasta	Slakt	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Axilur vet., 2,5 % oral suspension	Mjölk	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Axilur vet., 22 % granulat	Mjolk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	9	-	-	-	5	-	-	-	-
Axilur vet., 4 % oralt pulver	Slakt	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	Vid normal dos, 5 mg/kg.									
	Slakt	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Vid ökad dos, 25 mg/kg.										
Banminth vet., 44 % oral pasta	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Baycoxine vet, 50 mg/ml oral suspension till nöt, svin och får	Slakt	63	77	42	-	-	-	-	-	-
	<p>Nöt: Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.</p> <p>Får: Ej tillåtet för användning till lakterande får som producerar mjölk för humankonsumtion.</p>									
Baymite vet, 500 mg/ml koncentrat till spray, emulsion till värphöns	Slakt	-	-	-	-	-	25	-	-	-
	Efter andra behandlingen.									
	Ägg	-	-	-	-	-	12h	-	-	-
Ta bort ägg innan behandling. Kassera ägg som lagts under behandlingen och resten av dagen.										
Baytical vet., 10 mg/ml pour-on, lösning	Mjolk	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	10	-	10	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Bovilis Blue-8 injektionsvätska, suspension	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Bovilis Bovipast vet., injektionsvätska, suspension för nötkreatur	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Bovilis BTV8 injektionsvätska, suspension för nötkreatur och får	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Bovilis Ringvac vet., pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Boviseal vet, 2,6 g intramammär suspension mjölkkor vid sinläggning	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
BTVPUR AlSap 1-8 injektionsvätska, suspension för får och nötkreatur	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Carprosan vet., 50 mg/ml injektionsvätska, lösning nöt	Mjök	0h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	21	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceftiocyl Vet, 50 mg/ml injektionsvätska, suspension för svin och nöt	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	6	2	-	-	-	-	-	-	-
Ceftiofur N-vet, 50 mg/ml pulver och vätska till injektionsvätska, lösning till nöt och svin	Mjök	0h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Cepesedan vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst och nöt	Mjök	12h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	2	-	-	-	2	-	-	-	-
Chanox vet, 50 mg/ml oral suspension för svin, nötkreatur och får Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjök för humankonsumtion. Ej godkänt för användning till lakterande får som producerar mjök för humankonsumtion.	Slakt	63	77	42	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Circovac emulsion och suspension till injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Closamectin vet, 5 mg/ml + 200 mg/ml pour-on, lösning till nöt Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion, inklusive under sinperioden. Använd inte till kvigor under andra hälften av dräktighetsperioden om djuren är avsedda för mjölkproduktion för humant bruk. På grund av uppenbar risk för kontaminering med medlet mellan behandlade och obehandlade djur genom slickning, skall alla djur i en grupp behandlas samtidigt och behandlade djur hållas separerade från obehandlade djur under hela karenstiden. Om denna rekommendation inte följs kan det medföra att gränsvärden för läkemedlet överskrider hos obehandlade djur.	Slakt	28	-	-	-	-	-	-	-	-
CLYNAV injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Coglapix injektionsvätska, suspension för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Colicol vet., 240 mg/ml lösning för användning i dricksvatten	Slakt	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Coliprotec F4 frystorkat pulver för suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Coliprotec F4/F18 frystorkat pulver för suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Comforion vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	4	4	-	-	4	-	-	-	-
Compagel vet. gel för häst Använd inte till dräktiga eller lakterande djur som ska producera mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Contacera, 15 mg/ml oral suspension för hästar	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Contacera, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, svin och häst										
	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-
Coxevac injektionsvätska, suspension för nötkreatur och get										
	Mjölk	0	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	0	-	-	-	-	-
Cronyxin vet, 50 mg/g oral pasta för häst Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	15	-	-	-	-
Cyclopray vet, 78,6 mg/g kutan spray, suspension för svin, får och nötkreatur Använd inte på juver hos lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.										
	Mjölk	0h	-	0h	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Denagard vet., 20 mg/g premix till medicinfoder	Slakt	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Slakt	-	6	-	-	-	-	-	-	-	
	Förebyggande (vid 2,0 mg/kg kroppsvikt): 1 dag Behandling (vid 5 -10 mg/kg kroppsvikt): 6 dagar										
	Slakt	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
	Hönor Slakt: 1 dag Kalkoner Slakt: 4 dagar										
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
Karens ägg 0 dagar avser hönor											
Denagard vet., 200 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	22	-	-	-	-	-	-	-	
Detonervin, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst och nöt	Mjölk	12h	-	-	-	12h	-	-	-	-	
	Slakt	2	-	-	-	2	-	-	-	-	
Dexadreson vet., 2 mg/ml injektionsvätska, lösning Ej godkänt för användning till lakterande häst som producerar mjölk för humankonsumtion	Mjölk	72h	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	8	2	-	-	8	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Dexaject, 2 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, häst, gris, hund och katt Ej tillåtet för användning till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.	Mjölk	72h	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	8	2	-	-	8	-	-	-	-	-
Dihydrostreptomycin vet., 500 mg tablett Läkemedlet får användas till häst i enlighet med 4§ Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:3) om karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel, H 65, vilket innebär att en karenstid på minst 28 dygn skall tillämpas.	Mjölk	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-
Dilaterol vet., 25 mikrogram/ml sirap för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-
Dinalgen vet., 150 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt, svin och häst Ej tillåtet att använda till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Mjölk	0h	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-
Dinolytic vet., 12,5 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinolytic vet., 5 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Doxycycline Divasa-Farmavic, 200 mg/ml lösning för användning i dricksvatten										
Ej tillåtet för användning till äggläggande fåglar som producerar ägg för human konsumtion. Skall inte användas inom 4 veckor före äggläggningsperiodens början.	Slakt	-	4	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		efter en dos på 10 mg/kg kroppsvikt i 4 dagar								
	Slakt	-	-	-	-	-	12	-	-	-
		efter en dos på 20 mg/kg kroppsvikt i 4 dagar								
Draxxin, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning										
Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion. Skall inte ges till dräktiga djur som skall producera mjölk för humankonsumtion inom två månader före förväntad nedkomst.	Slakt	22	13	16	-	-	-	-	-	-
DRAXXIN, 25 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Slakt	-	13	-	-	-	-	-	-	-
Econor, 10 % oralt pulver för svin										
	Slakt	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Econor, 10 % premix till medicinfoder för svin										
	Slakt	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Econor, 50 % premix till medicinfoder för svin										
	Slakt	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ECOPORC SHIGA injektionsvätska, suspension										
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Emdocam, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt, svin och häst	Mjölk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-
Engemycin vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mjölk	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	Slakt	30	8	18	-	-	-	-	-	-
vid doser upp till 10 mg/kg kroppsvikt/dygn										
Enterisol Ileitis vet., frystorkat pulver och vätska till oral suspension till svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Eprecis vet, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt	Mjölk	0h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	63	-	-	-	-	-	-	-	-
Eprinex pour-on vet., 5 mg/ml pour-on, lösning	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Eprivalan vet, 5 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur, får och getter	Mjölk	0h	-	0h	0h	-	-	-	-	-
	Slakt	15	-	2	1	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Eprizero vet, 5 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur	Mjök	0h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Equibactin vet., 333 mg/g + 67 mg/g oral pasta för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjök för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	14	-	-	-	-
	Mjök	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equilis Prequenza Te, injektionsvätska, suspension för hästar	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Mjök	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equilis Prequenza, injektionsvätska, suspension för hästar	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Mjök	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equilis StrepE, frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för häst	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Mjök	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equilis Te, injektionsvätska, suspension för hästar	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Mjök	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equilis West Nile injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Mjök	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Equilis West Nile injektionsvätska, suspension, förfylld spruta										
	Mjolk	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equimax vet oral gel för häst Ej tillåtet att använda till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	35	-	-	-	-
Equimaxtabs vet, 150 mg/20 mg tugtablett för häst Ej tillåtet att använda till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	35	-	-	-	-
EQUIOXX, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-	-
EQUIOXX, 57 mg tugtablett	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-	-
EQUIOXX, 8,2 mg/g oral pasta för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-	-
Equip F vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equip FT vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equip T vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equip WNV injektionsvätska, emulsion för hästar	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Euthasol vet., 400 mg/ml injektionsvätska, lösning Tillräckliga åtgärder ska vidtas för att se till att kadaver av djur som behandlats med detta läkemedel, och restprodukterna från dessa djur, inte kommer in i näringskedjan och inte används för människors eller djurs konsumtion.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Evalon suspension och vätska till oral spray	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Exagon vet., 400 mg/ml injektionsvätska, lösning Tillräckliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att kadaver av djur som behandlats med detta läkemedel, och restprodukterna från dessa djur, inte kommer in i näringskedjan och inte används för människors eller djurs konsumtion.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excenel vet., pulver till injektionsvätska, lösning	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Exoflox vet., 25 mg/ml koncentrat till oral lösning Ej godkänt för användning till djur som producerar livsmedel för humankonsumtion.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exzolt, 10 mg/ml lösning för användning i dricksvatten till fjäderfä	Slakt	-	-	-	-	-	14	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Fenoflox vet, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötk och svin	Mjolk	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Intravenös injektion									
	Mjolk	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subkutan injektion									
	Slakt	-	13	-	-	-	-	-	-	-
Intramuskulär injektion										
Slakt	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
Intravenös injektion										
Slakt	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subkutan injektion										
Fenylbutazon vet., 1 g oralt pulver i dospåse Läkemedlet får endast användas till hästar som förklarats inte vara avsedda för livsmedelsproduktion, i enlighet med 2 kap 7 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:84) om läkemedel och läkemedelsanvändning, D9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ferglep vet, 200 mg/ml injektionsvätska, lösning för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	
Filavac RHD injektionsvätska, suspension för kaniner	Slakt	-	-	-	-	-	-	-	0	
Filavac RHD suspension och vätska till injektionsvätska, suspension för kaniner	Slakt	-	-	-	-	-	-	-	0	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Finadyne vet, 50 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur På grund av risk för kontaminering med detta läkemedel till icke-behandlade djur, t ex genom slickande, bör behandlade djur hållas åtskilda från icke-behandlade djur under hela karenstiden. Om denna rekommendation inte följs kan det leda till resthalter hos icke-behandlade djur.	Mjölk	36h	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
Flimabend vet, 100 mg/g suspension för användning i dricksvatten för svin och kyckling	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
	Slakt	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
		1 mg/kg kroppsvikt i 5 dagar.									
	Slakt	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
		2,5 mg/kg kroppsvikt i 2 dagar.									
	Ägg	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
Florselect vet, 300 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt och svin Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	30	18	-	-	-	-	-	-	-	
Flunipaste Vet., 50 mg/g oral gel Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion	Slakt	-	-	-	-	15	-	-	-	-	
Flunixin N-vet, 250 mg granulat till häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	15	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Flunixin N-vet, 50 mg/ml injektionsvätska, lösning till häst, nöt och svin Ej godkänt för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Mjölk	36h	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Obs! Godkännandet är tillfälligt återkallat för användning till nöt.										
	Slakt	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
	Obs! Godkännandet är tillfälligt återkallat för användning till häst avsedd för humankonsumtion. Får endast användas till häst som tas ur livsmedelskedjan.										
	Slakt	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Obs! Godkännandet är tillfälligt återkallat för användning till nöt.										
	Slakt	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Obs! Godkännandet är tillfälligt återkallat för användning till svin.											
Flyecto vet, 12,5 mg/ml pour-on, lösning för får	Mjölk	-	-	120h	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	-	-	8	-	-	-	-	-	-	
Folliplan vet., 4 mg/ml oral lösning för svin	Slakt	-	9	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
Ganutil, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, svin, häst, får och get	Mjölk	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
	Slakt	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
GastroGard, 370 mg/g oral pasta Använd inte till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Geopenil vet., 24 g pulver och vätska till injektionsvätska, lösning	Mjök	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	10	10	-	-	10	-	-	-	-
Gentaject vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning Häst: Ej godkänt för användning till hästar som producerar kött eller mjök för humankonsumtion.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gleptosil vet., 200 mg Fe³⁺/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	13	-	-	-	-	-	-	-	-
Halocur, 0,5 mg/ml oral lösning för kalvar	Slakt	13	-	-	-	-	-	-	-	-
		Karenstid avser spädkalv								

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Hippotrim vet., 200 mg/ml + 40 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjolk	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
	vid administrering 2 gånger per dygn.										
	Mjolk	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	vid administrering en gång per dygn										
	Slakt	48	42	-	-	-	-	-	-	-	
	vid administrering 2 gånger per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn										
Slakt	20	-	-	-	20	-	-	-	-		
vid administrering 2 gånger per dygn, i.v. injektion											
Slakt	24	21	-	-	-	-	-	-	-		
vid administrering en gång per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn											
Slakt	10	-	-	-	10	-	-	-	-		
vid administrering en gång per dygn, i.v. injektion											
Hippotrim vet., 288,3 mg/g + 58,0 mg/g oral pasta	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-		
Ej godkänt för användning till digivande lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.											
Hippoazol vet, 400 mg enterogranulat för häst	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-		
HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för nötkreatur	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-		
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-		

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Hipracal-FM infusionsvätska, lösning	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipracin vet., 17 mikrogram (10 IU)/ml injektionsvätska, lösning för svin, nöt, häst och hund	Mjök	0	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	0	0	-	-	0	-	-	-	-
Hipracox spray suspension och lösning till spray	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
HuveGuard MMAT vet suspension till oral suspension för kycklingar	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-
HuveGuard NB vet suspension till oral suspension för kycklingar	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-
HY-50 Vet., 17 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Hyobac App 2 Vet. injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Hyobac App Multi Vet. injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Hyonate vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Hyoresp, injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Ibmune frystorkat pulver till okulonasal suspension till kyckling	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Improvac injektionsvätska, lösning för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Imrestor, 15 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Inflacam, 15 mg/ml oral suspension för hästar Ej tillåtet för användning till digivande djur som producerar mjölk för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Inflacam, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt, svin och hästar Får ej användas för hästar som producerar mjölk för human konsumtion.	Mjolk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Inflacam, 330 mg granulat	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Inflacam, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund och katt. för nötkreatur och svin.	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Infusolec infusionsvätska, lösning för nöt, häst, hund och katt	Mjolk	0h	-	-	-	0h	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Ingelvac CircoFLEX injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingelvac MycoFLEX injektionsvätska, suspension för grisar	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingelvac PCV FLEX injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Innovax-ILT suspension och vätska till injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Innovax-ND-IBD suspension och vätska till injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Intraseal, 2,6 g intramammär suspension för kor										
	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Isocare Vet, 1000 mg/g inhalationsånga, vätska Mjölk: Inte godkänt för användning till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-
IsoFlo vet., 100 % inhalationsånga, vätska	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Ivomec Comp oral pasta häst Skall inte användas till ston som producerar mjölk för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	30	-	-	-	-
Ivomec pour on vet., 5 mg/ml pour-on, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Ivomec vet., 0,6 % premix till medicinfoder	Slakt	-	12	-	-	-	-	-	-	-
Ivomec vet., 0,8 mg/ml oral lösning Tackor och getter som producerar mjölk för human konsumtion får inte behandlas under laktation eller inom 28 dygn före laktation.	Slakt	-	-	6	8	-	-	-	-	-
Ivomec vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning när mjölken är avsedd för human konsumtion.	Slakt	49	28	-	-	-	-	28	-	-
Ivomec vet., 18,7 mg/g oral pasta Får inte användas till ston som producerar mjölk till humant bruk.	Slakt	-	-	-	-	14	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Ketador vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	0h	-	-	-	0h	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-
Ketaminol vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Ketaminol vet., 50 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Ketodolor vet, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst, nötkreatur och svin Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjök för human konsumtion.	Mjök	0h	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-
	Slakt	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		efter intramuskulär administrering									
		efter intravenös administrering									
Kexxtone, 32,4 g intraruminalinlägg, kontinuerlig frisättning	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lacosamide STADA, 200 mg filmdragerad tablett	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Lactovac vet. injektionsvätska, suspension	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Lidobel vet., 16 mg/ml injektionsvätska, lösning till häst, hund och katt	Mjök	-	-	-	-	5	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	5	-	-	-	-
Lidor vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Lincophar vet, 400 mg/ml lösning för användning i dricksvatten för kycklingar Inte avsett för användning till äggläggande fåglar som producerar ägg för mänsklig konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	5	-	-	-
	Locatim, oral lösning	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-
Gäller nyfödda kalvar som är yngre än 12 timmar.										
Loxicom, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst, nöt och svin	Mjök	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-
Loxicom, 50 mg/g oral pasta	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Nerfasin vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning till nötk och häst	Mjök	0h	-	-	-	0h	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Nerfasin vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning till nötk, häst, hund och katt	Mjök	0h	-	-	-	0h	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Nimatek Vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund, katt och häst	Mjök	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Nobilis Gumboro Inac. vet., injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Nobilis IB Ma5 vet., frystorkat pulver för suspension	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Nobilis IB Multi vet., injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Nobilis IB Primo QX frystorkat pulver för suspension	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Nobivac Rabies vet., 2 IE injektionsvätska, suspension	Mjölk	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-
Noromectin Comp vet., 18,7 mg + 140,3 mg oral pasta för häst Ej godkänt för användning till ston som producerar mjölk för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-
Noromectin Pour-on vet., 5 mg/ml pour-on, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Noromectin vet, 0,8 mg/ml oral lösning Skall ej användas till djur som producerar mjölk för human konsumtion. Djuren får inte behandlas inom 60 dagar före begynnande laktation om mjölken är avsedd för human konsumtion.	Slakt	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
Noromectin vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	49	28	-	-	-	-	28	-	-	-
Noromectin vet., 18,7 mg/g oral pasta Ivermektin skall ej ges till hästar vars mjölk är avsedd för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-
Noroseal, 2,6 g intramammär suspension för kor	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novamune koncentrat och vätska till injektionsvätska, suspension för kyckling	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Novaquin, 15 mg/ml oral suspension för häst	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Panacur AquaSol, 200 mg/ml suspension för användning i dricksvatten											
	Slakt	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	-	-	-	-	-	6	-	-	-	
		vid dosering med 1 mg fenbendazol/kg									
	Slakt	-	-	-	-	-	9	-	-	-	
		vid dosering med 2 mg fenbendazol/kg									
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
Paracox-5 vet., suspension för oral administrering för kycklingar											
		Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.									
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
Paracox-8 vet., suspension för oral administrering för kycklingar											
		Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion									
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
Partoxin vet., 10 IU/ml injektionsvätska, lösning											
	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-	
	Slakt	0	0	-	-	0	-	-	-	-	
Parvодук suspension och vätska till injektionsvätska, suspension											
		Do not use in birds in lay.									
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
Parvoruvax vet., injektionsvätska, suspension											
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Plegicil vet, 35 mg/ml oral gel för häst Läkemedlet är inte godkänt för användning till hästar avsedda för livsmedelsproduktion. Emellertid finns den aktiva substansen på listan över viktiga substanser för behandling av hästdjur, i enlighet med Kommissionens förordning (EG) 1950/2006. Därmed kan läkemedlet användas till häst förutsatt att en karenstid på minst sex månader tillämpas.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plegicil vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Läkemedlet är inte godkänt för användning till hästar avsedda för livsmedelsproduktion. Emellertid finns den aktiva substansen på listan över viktiga substanser för behandling av hästdjur, i enlighet med Kommissionens förordning (EG) 1950/2006. Därmed kan läkemedlet användas till häst förutsatt att en karenstid på minst sex månader tillämpas.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Polyvar, 275 mg bikupestrip Behandla inte under honungsdrag	Honung	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Porcilis APP vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis AR-T DF, injektionsvätska, suspension för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis ColiClos injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis Ery-Parvo vet., injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis PCV ID injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Pronestestic vet, 40 mg/ml + 0,036 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0h	-	0h	-	0h	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-
Prosolvlin vet., 7,5 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Proteq West Nile injektionsvätska, suspension för häst	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
ProteqFlu injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Pulmodox vet, 5 % premix till medicinfoder	Slakt	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
Quadrisol, 100 mg/ml oral gel till häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
Rabisin vet., 1 IE/dos injektionsvätska, suspension	Mjölk	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Ruvax vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Santiola vet, 50 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötk och får Ej godkänt för användning till lakterande kor som producerar mjölk för humankonsumtion, inklusive under sinperiod. Använd inte till dräktiga kvigor som ska producera mjölk för humankonsumtion under den sista trimestern före förväntad nedkomst. Ej godkänt för användning till lakterande tackor som producerar mjölk för humankonsumtion, inklusive under sinperiod. Använd inte inom 1 år före första lamning hos tackor som ska producera mjölk för humankonsumtion.	Slakt	77	-	77	-	-	-	-	-	-
Sebacil vet., 500 mg/ml koncentrat till kutan lösning Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	9	42	-	-	-	-	-	-
Sedivet vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-	-
Selevitan vet., 30 mg/g+0,6 mg/g granulat	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	0	-	-	-	-
Selevitan vet., 50 mg/ml+0,6 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	2	2	2	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Siccalactin vet. intramammär salva	Mjök	30	-	-	-	-	-	-	-	-
	Leverans av mjök får ske tidigast 4 dygn efter kalvning om behandling skett 4 veckor eller längre tid före kalvning. Leverans av mjök får ske tidigast 30 dygn efter behandling om denna skett 4-1 veckor före kalvning, dock tidigast 4 dygn efter kalvning. Leverans av mjök får ske tidigast 30 dygn efter kalvning om behandling skett 1 vecka eller kortare tid före kalvning.									
	Slakt	35	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvidine vet, 200 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst	Mjök	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Somulose, 400 mg/ml + 25 mg/ml avlivningsvätska för djur Får ej användas till djur avsedda för livsmedels eller foderproduktion. Behandlade djur får aldrig konsumeras av människa eller djur.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spasmium vet., 500 mg/ml + 4 mg/ml injektionsvätska, lösning Använd inte till ston som producerar mjök för humankonsumtion.	Mjök (i.v)	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt (i.m)	-	15	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt (i.v)	12	-	-	-	12	-	-	-	-
Spotinor vet, 10 mg/ml spot-on, lösning för nötkreatur och får Ej tillåtet för användning till fårhonor som producerar mjök för humankonsumtion.	Mjök	0h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	17	-	35	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
STARTVAC injektionsvätska, emulsion för nötkreatur										
	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Stellamune One vet., injektionsvätska, emulsion										
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Streptocillin vet., 200 mg/200 mg intramammär salva										
	Mjolk	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Streptocillin vet., 250 mg/ml + 200 mg/ml injektionsvätska, suspension										
Läkemedlet får användas till häst i enlighet med 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:3) om karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel, H 65, vilket innebär att en karenstid på 60 dygn skall tillämpas.										
	Mjolk	12	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	60	60	60	-	-	-	-	-	-
Suiseng vet. injektionsvätska, suspension för svin										
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Suivac APP Vet. injektionsvätska, emulsion för svin										
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Suvaxyn Aujesky 783+O/W, injektionsvätska, emulsion										
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Suvaxyn Circo injektionsvätska, emulsion										
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Suvaxyn Circo+MH RTU injektionsvätska, suspension										
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Suvaxyn CSF Marker frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Suvaxyn M. Hyo Mono injektionsvätska, emulsion för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Suvaxyn Parvo Ery injektionsvätska, emulsion för gris	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Suvaxyn PCV injektionsvätska, suspension för gris	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Suvaxyn PRRS MLV (125 doser) frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Suvaxyn PRRS MLV (25 doser) frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Suvaxyn PRRS MLV (50 doser) frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Synvet, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	-	-	-	-	0h	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Systamex vet., 3,75 g intraruminalinlägg, periodvis frisättning Lakterande mjölkkor eller kvigor som förväntas kalva inom 180 dygn får ej behandlas.	Slakt	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syvazul BTV (serotyp 1) injektionsvätska, suspension	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Syvazul BTV (serotyp 1+4) injektionsvätska, suspension	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Syvazul BTV (serotyp 1+8) injektionsvätska, suspension	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Syvazul BTV (serotyp 4) injektionsvätska, suspension	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Syvazul BTV (serotyp 4+8) injektionsvätska, suspension	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Syvazul BTV (serotyp 8) injektionsvätska, suspension	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Taf vet., 28,5 mg/g kutan spray, lösning	Mjök	0h	-	0h	0h	0h	-	-	-	-	-
	Använd inte på juver till lakterande djur som producerar mjök för humankonsumtion.										
	Slakt	0	14	0	0	0	-	-	-	-	0
Taurador vet., 5 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur Använd inte till lakterande kor som producerar mjök för humankonsumtion, eller sinkor eller dräktiga kvigor inom 60 dagar före kalvning.	Slakt	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terramycin vet., 500 mg intrauterin tablett	Mjök	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	10	10	-	-	-	-	-	-	-
Tetroxy prolongatum vet., 200 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	21	28	28	-	-	-	-	-	-	-
ThoroVAX vet., injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Toltarox vet., 50 mg/ml oral suspension för svin	Slakt	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-
Torbudine Vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för hundar, katter och hästar Ej godkänt för användning till ston som producerar mjök för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Torbugesic Vet, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning till häst, hund och katt	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Torphasol vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst	Mjölk	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Toxicol vet. injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tranquigel vet, 35 mg/g oral gel för hund och häst Ej godkänt för användning till hästar avsedda för humankonsumtion.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tranquinervin Vet, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst Läkemedlet är inte godkänt för användning till hästar avsedda för mänsklig konsumtion		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trichoben vet. pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Triclamox vet., 1 mg/ml + 50 mg/ml oral lösning till får Mjölk: Ej godkänt för användning till tackor som producerar mjölk för humankonsumtion, inklusive sinperioden. Använd inte till tackor som ska producera mjölk för humankonsumtion inom ett år före första lamning.	Slakt	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	31	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Tylucyl, 200 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och svin	Mjök	108h	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	28	14	-	-	-	-	-	-	-	-
UBAC injektionsvätska, emulsion	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ubroseal vet, 2,6 g intramammär suspension för nötkreatur	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ultrapen vet, 300 mg/ml injektionsvätska, suspension för nöt, svin och får	Mjök	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	28	14	28	-	-	-	-	-	-	-
Ultrasan vet. injektionsvätska, lösning	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	28	28	28	-	28	-	-	-	-	-
Uniferon, 200 mg fe ³⁺ /ml injektionsvätska, lösning	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Valbazen vet., 19 mg/ml oral suspension Får inte användas till får som producerar mjök för humankonsumtion.	Slakt	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
VarroMed, 5 mg/ml + 44 mg/ml bikupedisersion											
	Honung	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
VarroMed, 75 mg + 660 mg bikupedisersion											
	Honung	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Vaxxitek HVT+IBD, suspension och vätska till injektionsvätska, suspension											
Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Vectormune ND för kyckling suspension och vätska till injektionsvätska, suspension											
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Ventipulmin vet., 16 mikrogram/g granulat											
Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-
Ventipulmin vet., 25 mikrogram/ml oral lösning											
Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-
VEPURED injektionsvätska, suspension											
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Versiguard Rabies vet. injektionsvätska, suspension											
	Mjölk	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Vetalgin vet., 500 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjolk	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intravenös eller intramuskulär behandling som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt										
	Slakt	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-
	Intravenös behandling 2-3 ggr med 8 timmars intervall med en dos av högst 20-50 mg/kg kroppsvikt:										
	Slakt	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
Intravenös behandling som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt											
Slakt	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Intravenös eller intramuskulär behandling som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt											
Slakt	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	
Intravenös eller intramuskulär som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt											
Vetflurane, 1000 mg/g inhalationsånga, vätska för hästar, hundar, katter, burfåglar, reptiler, råttor, möss, hamstrar, chinchillor, ökenråttor, marsvin och illrar Produkten ska inte användas för behandling av ston som producerar mjölk för human konsumtion	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
	Intravenös eller intramuskulär som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt										
Vetrimoxin vet., 150 mg/ml injektionsvätska, suspension för nötkreatur och svin	Mjolk	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	18	20	-	-	-	-	-	-	-	
Vetroxy vet, 200 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, får och svin	Mjolk	10	-	7	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	31	18	9	-	-	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Vetzin vet, 1000 mg/g premix till medicinfoder för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigophos vet, 100 mg/ml + 0,05 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur	Mjölk	0h	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vorenvet vet., 1 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjölk	60h	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	42	42	-	-	42	-	-	-	-	-
Vulketan vet, 2,5 mg/g gel för hästar	Mjölk	-	-	-	-	0h	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Xylavet, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Xylocain adrenalin, 10 mg/ml + 5 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	<= 400 mg										
	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	> 400 mg										
Xylocain viskös, 20 mg/ml oral lösning	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Zeleris, 400 mg/ml + 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur	Slakt	56	-	-	-	-	-	-	-	-
	Not authorised for use in animals producing milk for human consumption.									
Zepromec vet, 5 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur	Mjölk	0h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Zerofen vet., 4 % oralt pulver för svin	Slakt	-	3	-	-	-	-	-	-	-
ZOLVIX, 25 mg/ml oral lösning för får Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	7	-	-	-	-	-	-
Zorabel vet, 50 mg/ml oral suspension för svin	Slakt	-	73	-	-	-	-	-	-	-
ZULVAC 1 Bovis injektionsvätska, suspension för nötkreatur	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
ZULVAC 1 Ovis injektionsvätska, suspension för får	Mjölk	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	0	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
ZUPREVO, 40 mg/ml injektionsvätska, lösning för svin										
	Slakt	-	9	-	-	-	-	-	-	-