

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Alvegesic vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för hästar, hundar och katter	Mjök	-	-	-	-	0h	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Aniketam vet, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-
	Slakt	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Apiguard vet, 12,5 g gel för honungsbin Använd inte läkemedlet under honungsdrag	Honung	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Apistan vet, 10,3 % bikupestrip Använd inte produkten under honungsdrag. Ta inte honung från yngelkammaren. Skörda inte honung medan behandling pågår. För att undvika ackumulering av läkemedelsrester i vaxet ska yngelramarna regelbundet förses med nya vaxmellanväggar. Återanvänd inte vax från behandlade bisamhällen i yngel- eller honungsramar.	Honung	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Apivar vet, 500 mg bikupestrip för honungsbin Använd inte under honungsdrag. Skörda inte honung från yngelrummet. Skörda inte honung när behandlingen pågår. Yngelramar bör bytas ut mot nya mellanväggar minst var tredje år. Yngelramar skall inte återanvändas som honungsramar.	Honung	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Aqualec, 9 mg/ml infusionsvätska, lösning för nöt, häst, hund och katt	Mjök	0h	-	-	-	0h	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Arti-Cell Forte, 1-2,5 miljoner celler injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Attane vet, 1000 mg/g inhalationsånga, vätska Ska ej användas till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Avicillin vet., 1000 mg/g pulver för användning i dricksvatten för kycklingar, ankor, kalkoner Ej godkänt för användning till äggläggande fåglar som producerar ägg för humankonsumtion och som påbörjat sin äggläggning eller inom 3 veckor före ägglägningens början.	Slakt Chicken	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Slakt Duck	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
	Slakt Turkey	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
Avipro AE vet., vaccin mot AE hos unghönor, oral suspension Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Avipro Thymovac vet. frystorkat pulver för användning i dricksvatten	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Axilur vet., 10 % oral suspension	Mjölk	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	9	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Axilur vet., 19 % oral pasta	Slakt	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Axilur vet., 2,5 % oral suspension	Mjök	-	-	6	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	14	-	-	-	-	-	-
Axilur vet., 22 % granulat	Mjök	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	9	-	-	-	5	-	-	-	-
Axilur vet., 4 % oralt pulver	Slakt	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	Vid normal dos, 5 mg/kg.									
	Slakt	-	5	-	-	-	-	-	-	-
	Vid ökad dos, 25 mg/kg.									
Banminth vet., 44 % oral pasta	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Baycoxine vet, 50 mg/ml oral suspension till nöt, svin och får	Slakt	63	77	42	-	-	-	-	-	-
Nöt: Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjök för humankonsumtion.										
Får: Ej tillåtet för användning till lakterande får som producerar mjök för humankonsumtion.										
Baymite vet, 500 mg/ml koncentrat till spray, emulsion till värphöns	Slakt	-	-	-	-	-	25	-	-	-
	Efter andra behandlingen.									
	Ägg	-	-	-	-	-	12h	-	-	-
	Ta bort ägg innan behandling. Kassera ägg som lagts under behandlingen och resten av dagen.									

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Bayticol vet., 10 mg/ml pour-on, lösning Bayticol vet. får ej användas till får som producerar mjölk för human konsumtion.	Mjölk	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	10	-	10	-	-	-	-	-	-
Baytril vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	-	-	3	4	-	-	-	-	-
	Mjölk Efter intravenös injektion	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mjölk Efter subkutan injektion	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	13	4	6	-	-	-	-	-
	Slakt Efter intravenös injektion	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt Efter subkutan injektion	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Baytril vet., 25 mg/ml injektionsvätska, lösning Ska inte användas till fåglar avsedda som livsmedel.	Slakt	-	13	-	-	-	-	-	-	6
Belfer vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning till hästar, kor, grisar, får, getter och hundar	Mjölk	0	-	0	0	0	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	0	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Benestermycin vet. intramammär salva	Mjolk	37	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vid behandling mindre än 35 dagar före kalvning, eller under laktation: 37 dagar efter behandling. Vid behandling 35 dagar eller mer före kalvning: 36 timmar efter kalvning.									
	Slakt	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Beviplex vet., injektionsvätska, lösning	Mjolk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	0	-	-	-	-
	Slakt	49	28	-	-	-	-	28	-	-
Bimectin vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	49	28	-	-	-	-	28	-	-
	Slakt	-	-	-	-	14	-	-	-	-
Bimectin vet., 18,7 mg/g oral pasta	Slakt	-	-	-	-	14	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Bimotrim vet., 200 mg/ml + 40 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Vid en dygnsdos på 15 mg/kg kroppsvikt i.m., s.c., eller i.v. i högst 5 dygn										
	Mjök	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Vid en dygnsdos på 2 gånger 15 mg/kg kroppsvikt i.m., s.c. eller i.v. i högst 5 dygn										
	Slakt	24	21	-	-	-	-	-	-	-	
	Vid en dygnsdos på 15 mg/kg kroppsvikt i.m. eller s.c. i högst 5 dygn										
Slakt	10	-	-	-	10	-	-	-	-		
Vid en dygnsdos på 15 mg/kg kroppsvikt i.v. i högst 5 dygn											
Slakt	48	42	-	-	-	-	-	-	-		
Vid en dygnsdos på 2 gånger 15 mg/kg kroppsvikt i.m. eller s.c. i högst 5 dygn											
Slakt	20	-	-	-	20	-	-	-	-		
Vid en dygnsdos på 2 gånger 15 mg/kg kroppsvikt i.v. i högst 5 dygn											
Bimoxyl vet., 150 mg/ml injektionsvätska, suspension	Mjök	4	-	-	-	-	-	-	-		
	Slakt	30	11	-	-	-	-	-	-		
Blaze vet., 7,5 mg/ml pour-on, suspension för nöt och får	Mjök	0	-	12h	-	-	-	-	-		
	Slakt	18	-	1	-	-	-	-	-		
BLUEVAC BTV8 injektionsvätska, suspension för nötkreatur och får	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-		
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-		

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Closamectin vet, 5 mg/ml + 200 mg/ml pour-on, lösning till nöt										
Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion, inklusive under sinperioden. Använd inte till kvigor under andra hälften av dräktighetsperioden om djuren är avsedda för mjölkproduktion för humant bruk. På grund av uppenbar risk för kontaminering med medlet mellan behandlade och obehandlade djur genom slickning, skall alla djur i en grupp behandlas samtidigt och behandlade djur hållas separerade från obehandlade djur under hela karenstiden. Om denna rekommendation inte följs kan det medföra att gränsvärden för läkemedlet överskrids hos obehandlade djur.	Slakt	58	-	-	-	-	-	-	-	-
CLYNAV injektionsvätska, lösning										
	Slakt	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Coglapix injektionsvätska, suspension för svin										
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Colicol vet., 240 mg/ml lösning för användning i dricksvatten										
	Slakt	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Coliprotec F4 frystorkat pulver för suspension										
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Coliprotec F4/F18 frystorkat pulver för suspension										
	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Comforion vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	4	4	-	-	4	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Compagel vet. gel för häst Använd inte till dräktiga eller lakterande djur som ska producera mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Contacera, 15 mg/ml oral suspension för hästar	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Contacera, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, svin och häst	Mjök	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-	-
Coxevac injektionsvätska, suspension för nötkreatur och get	Mjök	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Cronyxin vet, 50 mg/g oral pasta för häst Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
Cyclopray vet, 78,6 mg/g kutan spray, suspension för svin, får och nötkreatur Använd inte på juver hos lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Mjök	0h	-	0h	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Cydectin comp vet., 19,5 mg/g + 121,7 mg/g oral gel Skall ej ges till lakterande ston vars mjölk används för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-
Cydectin vet, 18,92 mg/g oral gel för häst	Slakt	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Denagard vet., 20 mg/g premix till medicinfoder	Slakt	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Slakt	-	6	-	-	-	-	-	-	-	
	Förebyggande (vid 2,0 mg/kg kroppsvikt): 1 dag Behandling (vid 5 -10 mg/kg kroppsvikt): 6 dagar										
	Slakt	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
	Hönor Slakt: 1 dag Kalkoner Slakt: 4 dagar										
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
Karens ägg 0 dagar avser hönor											
Denagard vet., 200 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	22	-	-	-	-	-	-	-	
Detonervin, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst och nöt	Mjölk	12h	-	-	-	12h	-	-	-	-	
	Slakt	2	-	-	-	2	-	-	-	-	
Dexadreson vet., 2 mg/ml injektionsvätska, lösning Ej godkänt för användning till lakterande häst som producerar mjölk för humankonsumtion	Mjölk	72h	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	8	2	-	-	8	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Dexaject, 2 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, häst, gris, hund och katt Ej tillåtet för användning till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.	Mjölk	72h	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	8	2	-	-	8	-	-	-	-	-
Dihydrostreptomycin vet., 500 mg tablett Läkemedlet får användas till häst i enlighet med 4§ Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:3) om karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel, H 65, vilket innebär att en karenstid på minst 28 dygn skall tillämpas.	Mjölk	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-
Dilaterol vet., 25 mikrogram/ml sirap för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-
Dinalgen vet., 150 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt, svin och häst Ej tillåtet att använda till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Mjölk	0h	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-
Dinolytic vet., 12,5 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinolytic vet., 5 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Eprinex pour-on vet., 5 mg/ml pour-on, lösning	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Eprivalan vet, 5 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur, får och getter	Mjolk	0h	-	0h	0h	-	-	-	-	-
	Slakt	15	-	2	1	-	-	-	-	-
Equibactin vet., 333 mg/g + 67 mg/g oral pasta för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	14	-	-	-	-
Equilis Prequenza Te, injektionsvätska, suspension för hästar	Mjolk	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equilis Prequenza, injektionsvätska, suspension för hästar	Mjolk	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equilis StrepE, frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för häst	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Mjolk	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Equilis Te, injektionsvätska, suspension för hästar	Mjolk	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Equilis West Nile injektionsvätska, suspension	Mjolk	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Equilis West Nile injektionsvätska, suspension, förfylld spruta	Mjolk	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Equimax vet oral gel för häst Ej tillåtet att använda till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-
Equimaxtabs vet, 150 mg/20 mg tuggtablett för häst Ej tillåtet att använda till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-
EQUIOXX, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-
EQUIOXX, 57 mg tuggtablett	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-
EQUIOXX, 8,2 mg/g oral pasta för häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-
Equip F vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Equip FT vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Equip T vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Equip WNV injektionsvätska, emulsion för hästar	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Equipulmin vet, 25 mikrogram/ml sirap till häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-
Equisedan vet, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst	Mjölk	-	-	-	-	12h	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Equisolon, 100 mg oralt pulver för häst	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
Equisolon, 300 mg oralt pulver för häst	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
Equisolon, 33,3 mg/g oralt pulver för häst	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
Equisolon, 600 mg oralt pulver för häst	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
Ej godkänt för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.											
Eraquell vet., 18,7 mg/g oral pasta Får ej användas till ston, som producerar mjölk till humant bruk.	Slakt	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-
Eraquell vet., 20 mg tuggtablett för häst Ej tillåtet för användning till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Filavac RHD suspension och vätska till injektionsvätska, suspension för kaniner	Slakt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Finadyne vet, 50 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur	Mjölk	36h	-	-	-	-	-	-	-	-	-
På grund av risk för kontaminering med detta läkemedel till icke-behandlade djur, t ex genom slickande, bör behandlade djur hållas åtskilda från icke-behandlade djur under hela karenstiden. Om denna rekommendation inte följs kan det leda till resthalter hos icke-behandlade djur.	Slakt	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flimabend vet, 100 mg/g suspension för användning i dricksvatten för svin och kyckling	Slakt	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	Slakt	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
1 mg/kg kroppsvikt i 5 dagar.	Slakt	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
2,5 mg/kg kroppsvikt i 2 dagar.	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Florselect vet, 300 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och svin	Slakt	30	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
Flunipaste Vet., 50 mg/g oral gel	Slakt	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
Flunixin N-vet, 250 mg granulat till häst	Slakt	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Flunixin N-vet, 50 mg/ml injektionsvätska, lösning till häst, nöt och svin Ej godkänt för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Mjölk	36h	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Obs! Godkännandet är tillfälligt återkallat för användning till nöt.										
	Slakt	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
	Obs! Godkännandet är tillfälligt återkallat för användning till häst avsedd för humankonsumtion. Får endast användas till häst som tas ur livsmedelskedjan.										
Flyecto vet, 12,5 mg/ml pour-on, lösning för får	Slakt	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Obs! Godkännandet är tillfälligt återkallat för användning till nöt.										
	Slakt	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
	Obs! Godkännandet är tillfälligt återkallat för användning till svin.										
Folliplan vet., 4 mg/ml oral lösning för svin	Mjölk	-	-	120h	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	-	-	8	-	-	-	-	-	-	
Folliplan vet., 4 mg/ml oral lösning för svin	Slakt	-	9	-	-	-	-	-	-	-	
Forceris, 30 mg/ml + 133 mg/ml injektionsvätska, suspension	Slakt	-	70	-	-	-	-	-	-	-	
Fyrantel vet, 400 mg/g oral pasta	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Ganutil, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, svin, häst, får och get	Mjök	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
GastroGard, 370 mg/g oral pasta Använd inte till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Geepenil vet., 24 g pulver och vätska till injektionsvätska, lösning	Mjök	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	10	10	-	-	10	-	-	-	-	-
Gentaject vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning Häst: Ej godkänt för användning till hästar som producerar kött eller mjölk för humankonsumtion.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gleptosil vet., 200 mg Fe³⁺/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
HALAGON, 0,5 mg/ml oral lösning för kalvar	Slakt	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Halocur, 0,5 mg/ml oral lösning för kalvar	Slakt	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Karenstid avser spädkalv									

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Hippotrim vet., 200 mg/ml + 40 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjolk	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
	vid administrering 2 gånger per dygn.										
	Mjolk	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	vid administrering en gång per dygn										
	Slakt	48	42	-	-	-	-	-	-	-	
	vid administrering 2 gånger per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn										
Slakt	20	-	-	-	20	-	-	-	-		
vid administrering 2 gånger per dygn, i.v. injektion											
Slakt	24	21	-	-	-	-	-	-	-		
vid administrering en gång per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn											
Slakt	10	-	-	-	10	-	-	-	-		
vid administrering en gång per dygn, i.v. injektion											
Hippotrim vet., 288,3 mg/g + 58,0 mg/g oral pasta	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-		
Ej godkänt för användning till digivande lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.											
Hippoazol vet., 400 mg enterogranulat för häst	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-		
HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för nötkreatur	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-		
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-		

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Hipracal-FM infusionsvätska, lösning	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipracin vet., 17 mikrogram (10 IU)/ml injektionsvätska, lösning för svin, nöt, häst och hund	Mjök	0	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	0	0	-	-	0	-	-	-	-
Hipracox spray suspension och lösning till spray	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
HuveGuard MMAT vet suspension till oral suspension för kycklingar	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-
HuveGuard NB vet suspension till oral suspension för kycklingar	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-
HY-50 Vet., 17 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Hyobac App 2 Vet. injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Hyobac App Multi Vet. injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Hyonate vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Hyoresp, injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Ibmune frystorkat pulver till okulonasal suspension till kyckling	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Improvac injektionsvätska, lösning för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Imrestor, 15 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta	Mjolk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Inflacam, 15 mg/ml oral suspension för hästar Ej tillåtet för användning till digivande djur som producerar mjölk för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Inflacam, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt, svin och hästar Får ej användas för hästar som producerar mjölk för human konsumtion.	Mjolk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Inflacam, 330 mg granulat	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Inflacam, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund och katt. för nötkreatur och svin.	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Infusolec infusionsvätska, lösning för nöt, häst, hund och katt	Mjolk	0h	-	-	-	0h	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Ingelvac CircoFLEX injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingelvac MycoFLEX injektionsvätska, suspension för grisar	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingelvac PCV FLEX injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Innovax-ILT suspension och vätska till injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Innovax-ND-IBD suspension och vätska till injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Isocare Vet, 1000 mg/g inhalationsånga, vätska Mjölk: Inte godkänt för användning till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
IsoFlo vet., 100 % inhalationsånga, vätska	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Ivomec Comp oral pasta häst Skall inte användas till ston som producerar mjölk för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-
Ivomec pour on vet., 5 mg/ml pour-on, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ivomec vet., 0,6 % premix till medicinfoder	Slakt	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Ivomec vet., 0,8 mg/ml oral lösning Tackor och getter som producerar mjölk för human konsumtion får inte behandlas under laktation eller inom 28 dygn före laktation.	Slakt	-	-	6	8	-	-	-	-	-	-
Ivomec vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning när mjölken är avsedd för human konsumtion.	Slakt	49	28	-	-	-	-	28	-	-	-
Ivomec vet., 18,7 mg/g oral pasta Får inte användas till ston som producerar mjölk till humant bruk.	Slakt	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-
Ketador vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0h	-	-	-	0h	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-
Ketaminol vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Lidobel vet., 16 mg/ml injektionsvätska, lösning till häst, hund och katt	Mjolk	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Lidor vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjolk	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Lincophar vet, 400 mg/ml lösning för användning i dricksvatten för kycklingar Inte avsett för användning till äggläggande fåglar som producerar ägg för mänsklig konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gäller nyfödda kalvar som är yngre än 12 timmar.											
Loxicom, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst, nöt och svin	Mjolk	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-	-
Loxicom, 50 mg/g oral pasta	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Maxyl vet, 500 mg/g pulver för användning i dricksvatten för kycklingar, kalkoner, ankor och grisar Ej godkänt för användning till fåglar som producerar ägg för humankonsumtion och som påbörjat sin äggläggning eller inom 3 veckor före äggläggningens början.	Slakt	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt Ankor	-	-	-	-	-	9	-	-	-
	Slakt Kalkoner	-	-	-	-	-	5	-	-	-
	Slakt Kycklingar	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Melovem, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt, svin, och häst	Mjolk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-
Melovem, 30 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt och svin	Mjolk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-
Melovem, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och svin	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-
Meloxidolor, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjolk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Nerfasin vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning till nötk och häst	Mjölk	0h	-	-	-	0h	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Nerfasin vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning till nötk, häst, hund och katt	Mjölk	0h	-	-	-	0h	-	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Nimatek Vet., 100 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund, katt och häst	Mjölk	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Nobilis Gumboro Inac. vet., injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Nobilis IB Ma5 vet., frystorkat pulver för suspension	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Nobilis IB Multi vet., injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Nobilis IB Primo QX frystorkat pulver för suspension	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Nobivac Rabies vet., 2 IE injektionsvätska, suspension	Mjök	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-
Noromectin Comp vet., 18,7 mg + 140,3 mg oral pasta för häst Ej godkänt för användning till ston som producerar mjölk för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-
Noromectin Pour-on vet., 5 mg/ml pour-on, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Noromectin vet, 0,8 mg/ml oral lösning Skall ej användas till djur som producerar mjölk för human konsumtion. Djuren får inte behandlas inom 60 dagar före begynnande laktation om mjölken är avsedd för human konsumtion.	Slakt	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
Noromectin vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.	Slakt	49	28	-	-	-	-	28	-	-	-
Noromectin vet., 18,7 mg/g oral pasta Ivermektin skall ej ges till hästar vars mjölk är avsedd för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-
Noroseal, 2,6 g intramammär suspension för kor	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novamune koncentrat och vätska till injektionsvätska, suspension för kyckling	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Novaquin, 15 mg/ml oral suspension för häst	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Panacur AquaSol, 200 mg/ml suspension för användning i dricksvatten	Slakt	-	4	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	-	6	-	-	-
	vid dosering med 1 mg fenbendazol/kg									
	Slakt	-	-	-	-	-	9	-	-	-
vid dosering med 2 mg fenbendazol/kg										
Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Paracox-5 vet., suspension till oral suspension för kycklingar Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Paracox-8 vet., suspension till oral suspension för kycklingar Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Partoxin vet., 10 IU/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	0	0	-	-	0	-	-	-	-
Parvодук suspension och vätska till injektionsvätska, suspension Do not use in birds in lay.	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Parvoruvax vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Pirsue, 5 mg/ml intramammär lösning	Mjolk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	23	-	-	-	-	-	-	-	-
Plegicil vet, 35 mg/ml oral gel för häst Läkemedlet är inte godkänt för användning till hästar avsedda för livsmedelsproduktion. Emellertid finns den aktiva substansen på listan över viktiga substanser för behandling av hästdjur, i enlighet med Kommissionens förordning (EG) 1950/2006. Därmed kan läkemedlet användas till häst förutsatt att en karenstid på minst sex månader tillämpas.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plegicil vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Läkemedlet är inte godkänt för användning till hästar avsedda för livsmedelsproduktion. Emellertid finns den aktiva substansen på listan över viktiga substanser för behandling av hästdjur, i enlighet med Kommissionens förordning (EG) 1950/2006. Därmed kan läkemedlet användas till häst förutsatt att en karenstid på minst sex månader tillämpas.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Polyvar, 275 mg bikupestrip Behandla inte under honungsdrag	Honung	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Porcilis APP vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis AR-T DF, injektionsvätska, suspension för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis ColiClos injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis Ery-Parvo vet., injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Porcilis PCV ID injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis PCV injektionsvätska, emulsion för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis PCV M Hyo injektionsvätska, emulsion för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis Pesti injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Porcilis Porcoli Diluvac Forte, injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Poulvac E.coli frystorkat pulver till suspension för okulonasal eller sprayadministrering	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Prascend, 1 mg tablett för häst Ej tillåtet för användning till hästar avsedda för humankonsumtion. Det måste intygas att hästen inte är avsedd för humankonsumtion i enlighet med nationell lagstiftning om hästpass. Ej tillåtet för användning till ston som producerar mjölk avsedd för humankonsumtion.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Procamidor vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0h	-	0h	-	0h	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Procapen vet, 3 g intramammär suspension för nötkreatur	Mjök	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Pronestestic vet, 40 mg/ml + 0,036 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	0h	-	0h	-	0h	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	0	-	-	-	-
Prosolvlin vet., 7,5 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	0	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Proteq West Nile injektionsvätska, suspension för häst	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
ProteqFlu injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
ProteqFlu-Te injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Pulmodox vet, 5 % premix till medicinfoder	Slakt	-	7	-	-	-	-	-	-	-
Quadrisol, 100 mg/ml oral gel till häst Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjök för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	12	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Rhemox vet, 500 mg/g pulver för användning i dricksvatten Ej godkänt för användning till äggläggande fåglar som producerar ägg för humankonsumtion och inom 4 veckor innan ägglägningsperioden börjar.	Slakt	-	6	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt Ankor	-	-	-	-	-	9	-	-	-
	Slakt Kalkoner	-	-	-	-	-	5	-	-	-
	Slakt Kycklingar	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Rheumocam för hund och katt, 5 mg/ml injektionsvätska, lösning hund och katt samt nötkreatur (kalvar och yngre nötkreatur) och svin	Slakt	15	5	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Rheumocam för nötkreatur, svin och häst, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjolk	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	5	-	-	5	-	-	-	-
Rheumocam, 330 mg granulat i dospåse för häst	Mjolk	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	3	-	-	-	-
RHINISENG injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Ruvax vet., injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Santiola vet, 50 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt och får Ej godkänt för användning till lakterande kor som producerar mjölk för humankonsumtion, inklusive under sinperiod. Använd inte till dräktiga kvigor som ska producera mjölk för humankonsumtion under den sista trimestern före förväntad nedkomst. Ej godkänt för användning till lakterande tackor som producerar mjölk för humankonsumtion, inklusive under sinperiod. Använd inte inom 1 år före första lamning hos tackor som ska producera mjölk för humankonsumtion.	Slakt	77	-	77	-	-	-	-	-	-
Sebacil vet., 500 mg/ml koncentrat till kutan lösning Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	9	42	-	-	-	-	-	-
Sedivet vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för human konsumtion.	Slakt	-	-	-	-	10	-	-	-	-
Selevitan vet., 30 mg/g+0,6 mg/g granulat	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	-	0	-	-	-	-
Selevitan vet., 50 mg/ml+0,6 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	2	2	2	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Siccalactin vet. intramammär salva	Mjök	30	-	-	-	-	-	-	-	-
	Leverans av mjök får ske tidigast 4 dygn efter kalvning om behandling skett 4 veckor eller längre tid före kalvning. Leverans av mjök får ske tidigast 30 dygn efter behandling om denna skett 4-1 veckor före kalvning, dock tidigast 4 dygn efter kalvning. Leverans av mjök får ske tidigast 30 dygn efter kalvning om behandling skett 1 vecka eller kortare tid före kalvning.									
	Slakt	35	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvidine vet, 200 mg/ml injektionsvätska, lösning för häst	Mjök	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Somulose, 400 mg/ml + 25 mg/ml avlivningsvätska för djur Får ej användas till djur avsedda för livsmedels eller foderproduktion. Behandlade djur får aldrig konsumeras av människa eller djur.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spasmipur vet., 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	12h	-	12h	-	12h	-	-	-	-
	Slakt	2	9	18	-	3	-	-	-	-
Spasmium vet., 500 mg/ml + 4 mg/ml injektionsvätska, lösning Använd inte till ston som producerar mjök för humankonsumtion.	Mjök (i.v)	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt (i.m)	-	15	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt (i.v)	12	-	-	-	12	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Synvet, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning										
	Mjolk	-	-	-	-	0h	-	-	-	-
	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Systemex vet., 3,75 g intraruminalinlägg, periodvis frisättning										
Lakterande mjölkkor eller kvigor som förväntas kalva inom 180 dygn får ej behandlas.	Slakt	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Syvazul BTV (serotyp 1) injektionsvätska, suspension										
	Mjolk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Syvazul BTV (serotyp 1+4) injektionsvätska, suspension										
	Mjolk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Syvazul BTV (serotyp 1+8) injektionsvätska, suspension										
	Mjolk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Syvazul BTV (serotyp 4) injektionsvätska, suspension										
	Mjolk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Syvazul BTV (serotyp 4+8) injektionsvätska, suspension										
	Mjolk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Syvazul BTV (serotyp 8) injektionsvätska, suspension	Mjölk	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Taf vet., 28,5 mg/g kutan spray, lösning	Mjölk	0h	-	0h	0h	0h	-	-	-	-
	Använd inte på juver till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.									
	Slakt	0	14	0	0	0	-	-	-	-
Terramycin vet., 500 mg intrauterin tablett	Mjölk	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	Slakt	7	10	10	-	-	-	-	-	-
Tetroxy prolongatum vet, 200 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjölk	7	-	7	-	-	-	-	-	-
	Slakt	21	28	28	-	-	-	-	-	-
ThoroVAX vet., injektionsvätska, emulsion	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Toltarox vet, 50 mg/ml oral suspension för svin	Slakt	-	77	-	-	-	-	-	-	-
Torbudine Vet., 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för hundar, katter och hästar Ej godkänt för användning till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Tylocure, 910 mg/g granulat för användning i dricksvatten	Slakt	-	24h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mjök	108h	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tylucyl, 200 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och svin	Slakt	28	14	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UBAC injektionsvätska, emulsion	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ubroseal vet, 2,6 g intramammär suspension för nötkreatur	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ultrapen vet, 300 mg/ml injektionsvätska, suspension för nöt, svin och får	Slakt	28	14	28	-	-	-	-	-	-	-
	Mjök	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Ultrasan vet. injektionsvätska, lösning	Slakt	28	28	28	-	28	-	-	-	-	-
	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Uniferon, 200 mg fe ³⁺ /ml injektionsvätska, lösning	Slakt	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	Mjök	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Valbazen vet., 19 mg/ml oral suspension Får inte användas till får som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	14	-	-	-	-	-	-
VarroMed, 5 mg/ml + 44 mg/ml bikupedisersion	Honung	-	-	-	-	-	-	-	0	-
VarroMed, 75 mg + 660 mg bikupedisersion	Honung	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Vaxxitek HVT+IBD, suspension och vätska till injektionsvätska, suspension Ej till fjäderfä som producerar ägg för human konsumtion	Slakt	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Vectormune ND för kyckling suspension och vätska till injektionsvätska, suspension	Ägg	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Ventipulmin vet., 16 mikrogram/g granulat Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	28	-	-	-	-
Ventipulmin vet., 25 mikrogram/ml oral lösning Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	-	-	28	-	-	-	-
VEPURED injektionsvätska, suspension	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Versiguard Rabies vet. injektionsvätska, suspension	Mjölk	0	-	0	0	0	-	-	-	-
	Slakt	0	0	0	0	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)										
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin	
Vetalgin vet., 500 mg/ml injektionsvätska, lösning	Mjök	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intravenös eller intramuskulär behandling som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt										
	Slakt	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-
	Intravenös behandling 2-3 ggr med 8 timmars intervall med en dos av högst 20-50 mg/kg kroppsvikt:										
	Slakt	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
Intravenös behandling som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt											
Slakt	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Intravenös eller intramuskulär behandling som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt											
Slakt	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	
Intravenös eller intramuskulär som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt											
Vetflurane, 1000 mg/g inhalationsånga, vätska för hästar, hundar, katter, burfåglar, reptiler, råttor, möss, hamstrar, chinchillor, ökenråttor, marsvin och illrar Produkten ska inte användas för behandling av ston som producerar mjölk för human konsumtion	Slakt	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
Vetrimoxin vet., 150 mg/ml injektionsvätska, suspension för nötkreatur och svin	Mjök	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	18	20	-	-	-	-	-	-	-	
Vetroxy vet, 200 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, får och svin	Mjök	10	-	7	-	-	-	-	-	-	
	Slakt	31	18	9	-	-	-	-	-	-	

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Vetzin vet, 1000 mg/g premix till medicinfoder för svin	Slakt	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Mjök	0h	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigophos vet, 100 mg/ml + 0,05 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mjök	60h	-	-	-	-	-	-	-	-
Vorenvet vet., 1 mg/ml injektionsvätska, suspension	Slakt	42	42	-	-	42	-	-	-	-
	Mjök	0	-	-	-	0h	-	-	-	-
Vulketan vet, 2,5 mg/g gel för hästar	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Mjök	0	-	-	-	0	-	-	-	-
Xylavet, 20 mg/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	Mjök	0	-	-	-	0	-	-	-	-
Xylocain adrenalin, 10 mg/ml + 5 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	<= 400 mg									
	Slakt	-	-	-	-	1	-	-	-	-
> 400 mg										
Xylocain viskös, 20 mg/ml oral lösning	Slakt	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Mjök	0	-	-	-	0	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
Zeleris, 400 mg/ml + 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur	Slakt	56	-	-	-	-	-	-	-	-
	Not authorised for use in animals producing milk for human consumption.									
Zepromec vet, 5 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur	Mjölk	0h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Zerofen vet., 4 % oralt pulver för svin	Slakt	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Zitch Vet, 40 mg/ml pour-on, lösning Ej godkänt för användning hos hästar eller åsnor som är avsedda för humankonsumtion.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZOLVIX, 25 mg/ml oral lösning för får Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.	Slakt	-	-	7	-	-	-	-	-	-
Zorabel vet, 50 mg/ml oral suspension för svin	Slakt	-	73	-	-	-	-	-	-	-
ZULVAC 1 Bovis injektionsvätska, suspension för nötkreatur	Mjölk	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
ZULVAC 1 Ovis injektionsvätska, suspension för får	Mjölk	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Slakt	-	-	0	-	-	-	-	-	-

Preparat	Karenstid i dygn (om ej annat anges; <i>h</i> =timmar, <i>m</i> =månader)									
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäderfä	Ren	Fisk	Bi	Kanin
ZULVAC 1+8 Bovis injektionsvätska, suspension	Mjök	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
ZULVAC 1+8 Ovis injektionsvätska, suspension	Slakt	-	-	0	-	-	-	-	-	-
ZULVAC 8 Bovis injektionsvätska, suspension för nötkreatur	Slakt	0	-	-	-	-	-	-	-	-
ZULVAC 8 Ovis injektionsvätska, suspension för får	Slakt	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Zulvac BTV injektionsvätska, suspension	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-
ZULVAC SBV injektionsvätska, suspension	Slakt	0	-	0	-	-	-	-	-	-
ZUPREVO, 180 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur Får ej ges till djur som producerar mjök för humankonsumtion. Får ej ges till dräktiga djur som är ämnade för produktion av mjök för humankonsumtion inom 2 månader före förväntad kalvning.	Slakt	47	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUPREVO, 40 mg/ml injektionsvätska, lösning för svin	Slakt	-	9	-	-	-	-	-	-	-